楓亭先生口授

完

六 五之内

目録

楓亭先生口授全

中風

素問ハ中風ト云劉河間ハ大ト云東垣ハ内傷ト云許仁則ハ思慮労役飲酒ニテ五志過極メ陽気元テ発スルヽ諸説アレ氏余ハ先ツ許仁則ノ説ニ从フヽ今世病ムハ皆半身不遂中风也世上医卒中風半身中風ト分ツハ非也中風中ニ混スヘヽ如何ナレハ中風ヲ発スル人ハ平生ヨリ望

問ニテ大抵ハ知レハ或ハ中風ノ氣呆ヲ
先ニ見ハシリ〳〵トメ半身不遂メ病ムヲ凡
其病因ヲ考ルニ同症ニメ病ノ軽重シ此
病肥人ニ多クアルハ譬ハ夏月盛暑ニタ
エズメ草木ノモウ如シ免角ニ阳氣亢ル
症也故大凡四五十以上ノ人多ク病ム又
偶小児ニモ有モノシ其以下ノ人ノ病ハ
希シ右ノ如ク老人ニ多アルハ長寿スル
人ハ阳氣強クメ中风ヲヤムクライノ阳

ナケレハ八九十ノ長寿ハナラヌ也故ニ
以テ多ト云中風ノ発スル時ハ風呂ニ入
或ハ厠ニ行或食後ホニ発スル也陽症ニ
陽発ノ事故重陽ニナル也故ニ発ヌ也此
症ニ食ヲ吐スルハ難治也今世上医カ此
食ヲ吐スルヲ見テ中風トハ知シラスシテ
食タイト云ナリ此ハ望怯ニアタルコト
ナリ此ヨウナル症ハ鼾腄モナクメ言語
モ叶ヒ手足モ常ノ如シ只或ハ妄言シ失

度ノ事有此ニテ知ヘシ吐食ハ陽気亢盛メ胃気逆スル故也或ハ胃気逆メ喉ニツマツニテ喘スル也又許仁則中風中ニ狂症ヲ発スル事アルモノ也又風痱症ハ中風中ニテ息痩難分別痱トハ霊枢経ニ無痛メ四支不收ト云此症少ハ似タル事モアレ尼分チカタシ故半身中風ヘ混メ其外中風諸症色々方書ニ弁アレ尼只今病ハ半身中風也又此症ニ汗出ルシ鼾睡ハ治スモ不治モアリ此上條ニ弁スル卒中ハ俗ニ云トンシノ如キヲ云ヘキヤトンシニハ寢テ

中ニ発ノ直ニ死スモノ也此症ニ俗ニ云肩ヲ大
分刺ヌ忽ニ血ヲ出セハ治トイヘ圧未試也其位
ニテ治スル者カ余程病カ急シキ者也又金匱ニ
弁スル処詳也風痺ニ似タルモノ故ニ半身不遂
上臂不遂トヲ脉ニテ分ツ痺症モ色々アレ圧微
脉ニナル也中風ハ洪大滑大ニナル也故ニ平人
気象論ニ脉滑ハ風トシ濇ハ痺トスル也又金匱
ニ浮緊ニナルト云ヘ圧古今ノ違アルヤ浮緊ニ
ハナラヌ也以上凡テ中風初発ニハ第一竹瀝湯

ヲ用此湯方ハ葛根汁ハ市中ニテハ生葛根難得
故ニ生葛根大五盃ヲ水一盃入又ニ薬竹瀝汁五
タ位入テカキマセ生姜ノシボリ汁ニテ服用ヌ
竹瀝モ外臺ニハ董竹ト云ヘ氏和産ナシ故ニ淡
竹汁ヲ用生葛根ヲ用ユレハ其製法外臺許仁則
中風論中ニ詳ニ出先右ノ湯ヲ服用メカラ正気
モツキテカラハ第二竹瀝湯ニ移リ用ユ又ハ烏
犀角円ナトモ凡テ分チテシバカラウテ用ユル
シ烏犀角円ハ薬菜ノ通セヌニ用テ夫ヨリ薬菜ヲ

用モアリ又病源ナドノ中風ハ尽ク半身不遂ノ中
風ニ類スル処モアリ右ノ半身中風ハ金匱夫風
之為病当半身不遂云ニ此今ノ中風シ又今偏枯
ヲ余ノ中風也ト云亦非シ凡テ中風不語ノモノ
ハ難治十四五日ニメ少々ヅヽ言ハ治スルシ音
声モ不出又少シモ不語ハ治シカタキシ又沫ヲ
吐スルモノハ愈カタシ元中風虚実トモニアリト
云ヘトモ上ニ云如ク実症多シ野菜テマウ如キ者
シ又中風口喎スルハ不病方ヘユカムシ癇証ハ

病方ヘ唱スル世此說出医種子其唱スル時皂痰
末ヲ酢ニテトキ病方ヘ刷バ一旦ハ治スル者シ
医種子之說出別本医種子ハ諺書シ
半身中風今世上ニ有ト云ハ如何ナレハ卒倒不
省人事凡テ手ヲ動ス皆右カ左カ半身ナリ傷寒論
ニハ矢ノ的ニ中ル如ク風ニアタルヲ中風ト云
テ只寒ニ傷ラレ只半身不遂ト斗云王安道ハ古
ト今ト病外異シト其說不一又後世傷寒論中風
ト相混スルヲ以テ傷寒論中風ヲ傷風ト云又巣

氏病源候論ニ中風候ト云ハ此風ハ何ヲ云ヤ未
詳凡テ素問以下巣氏時分迄ハ風ノ字未詳又或
人風病ニト云モ風者為百病之長ト云テ見レハ
全病モ云カタシ
又中風ノ証ニ多ク欠スルハ陽ニ引レ欠ハ陽ニ
相引モアル也此症ノハ陽ノ亢盛ナル故ニ卒ニ
○中風ハ素ヨリ発リ十日モ不語ナルハ不治ノ候ニ其内少シツ
同ナドノモ
不合劉河間ハ ニイヒくト云テ舌ヲ動スハ治スル△許仁則
同ノモ少シ
ハ△ ニ但タレモ素問ヲ主ニトリタル故異ニ○吐食

ノ最初症ハタワヿヲ云テ煩悶メ妄言シウヂク
メ居ル内ニ吐スルヿ其吐ヲ見テハ食セウカト
云也一度吐スレハ喘メ食不通之一度目ハ菜ハ
通スルヿ咽ノ喘ノナキ内ヲ見テハ人モ知ルヿ
吐ノアルハ日数ハ延スモノヿ重ハ半時斗ニメ
絶汁出テ急ニ喘メ死スルヿ又軽キハ半日斗ノ
内ニ聞ク者モアリ然レ圧吐症ニヒラクハ百ニ
十人ホドハカナシ吐ハ胃気逆ト医通ニ云ヘリ
中風ハ陽気亢ル故カ下利セズメ大便秘結スルハ

广子人丸或寄煎ヲサスヘシ不然ハ大黄ナトノ
入茶ヲ用ヘキ也下利スルハ疲症世死スルヿ又
男子毎ナドハ阳茎ノ発起スルアリ阳ノ亢世又
吐スルニ痰汁茶汁ヲ吐スルアリ同胃気ノ逆ヿ
竹瀝ニテ不通ハ烏犀角円ハ通スルヿ中風ハ治ク
チアルハステヽヲヒテモ治スル迄ハ行テ今少
シサヲラヌヿ故三度テ又年ヲ経テ発ス是非死
スルモハ中風ヲ発スルヿ○灸治ハキカヌヿ故
ニトシトスエス○又大历ヨキニモ烏犀円ヲ用

レハ食モヨク食メ気カルニノ大便モ快ヨク通スルニ不語ノモノヨク言ニ甚奇効アリ○烏鳥犀円製ハ尾張名古屋製製小見山茱卯製又加州ヨリモ出ツ是ハ金沢ト云処アル斗ニ出処ハ未詳袋ニ中山製トアリ

○中風ハ食過タリ心志ヨツカエバアシヽヨクヽ心ヲ付ベシ凡テ中風ハ崔氏小續命湯圭附ヲ婦人ハ烏薬順気ヲ用ヘシ世医理中湯或ハ半夏瀉心湯ヲ用テ愈ルモノアレド是皆病ノ自然ト治

スルニ一旦発メ後大テイ愈テモ今一段ニナリ

テ愈カヌル者ニ大テイ発スルモ死スルドモ同様 様

ニナルモノニ

○烏犀円ハ中風ニ悪シ、ト云コト丹溪○発揮

ニ弁メヨリ名古屋氏ノ問餘ニモ悪ト云ヘドモ非

ニ随分効アリ

卒中風

半身不遂或ハ言語ナドニナレハ トテ モ知ルレドモ卒
中風ナトギザスドモサイ初ニ吐アリテ霍乱ナド
ノヨウニ見ヘ医者ニヨリテ食結ナド、イウテ
中風ノ名ヲ不言サテ霍乱トノ分テハ霍乱ハ先
服痛アリテ其後吐食スル者也中風ハ服痛ナク
タヾムカツキ出気却テアリ泻ハナキ者也ダン
〱ト食ヲ吐キサテハク内ニハ言語モカワラ子
ドモタン〱ト食ヲハキ其上半身不遂ニタニゼン

或ハイビキナド出テ人ト應對ノ出キザル者モ
脉ハ浮大洪弦滑大ナル者モ半身不遂不語トナ
ル者ナリ此𪜈ニ至レハヨク分レ𪜈吐食ノ内ニ
ハ分リカヌルモ霍乱ハ脉緊数ニナル者モ卒中
ノ発スル時刻ヲ見ルニ多リハ風呂アカリ又ハ
食後ニモ多クミタルトキ又ハカワヤニノホリタ
ルアトカニ多ク発スル者モ中風ノ発スル人ハ
曽燕多ク大便秘結スル者モサイ初ニハ先タンゼ
ン強クハ急ニ菜ヲ与レハ通リニクシ先鳥犀円

ナドアラハ樹目五厘カ一分ホド用テサニテ煎茶
ハ第一ノ竹瀝湯ヲ用ヒ葛根モ生葛根アラバヨシ
生葛根汁ヲ一匁竹瀝ニ合用イ一処ニ〆ヒトニ
ヘタヽシテ少シツヽ用ルヿ多ク用レハ咽喉ヘ
○気ミチ通リニクシ少シ用也通リニクバ鼻ヨツ
マミテ口ヘ入ルレハ通ルヿサテ又急ニ食物ナ
ドリアトウベカラズ急ニ食ヲ与レハ吐食スル
ヿ一日一夜ニ子リ湯ニテ用ユ尤菜ニカタザル
ヤウニ用ユ右ノ通ソロ〱療治スレハタイ作テイ

脉ノツヨキ人ハ治スル者〻右薬ナドモ病勢ノ次第ニユルミテ自治スル薬ニテタンセンノ開クヿパナシ薬ヲムリニタン〳〵用レハ吐ヲムカヘル〻薬ハキカザル者ヒ大タイノ外ヨク〳〵心得可

○謙斎曰卒中風初発スルトキハ小便ナト自利スルモノ〻医者ニヨリテコレヲキラヘドモ是ハ格別ノヿモナキモノ〻併熱便ナルニヨリテ下ヲカヘザル時ハ遺尿ニヨリテカフレツキ雁瘡ノ如トコズレト云ニナリ凡テ熱アル病人ニ遺尿スル

ハ下ヨカエザル寸ハ多ク右ノ遍ニ瘡ヲ生シ次
第〻ニ大ナルトキハ癰ノヤウナリテ本病ハ扨ヲ
キ右ノ標病ヨリ難治ノ症トナリテ死ニ至ルア
リサテ民間賣薬ニ中風根切薬ナド云テ用ユ功
能書ヲ見ルニ病発シヨリ三日ノ内ナラハ効ア
リ三日過レハ効ナシナトヽ云テ病家ヲマドワ
シ又軽卒ノ人ハ医者ナトニ相談スルヿアリ左
様ノ寸ハ是ハ他人エ相談スベシカ様ノヿニハ
相談ニ乗カタシト云ベシ中風ト云者ハ余薬ハ

キカヌ者ニテ薬ヲ不与モ体ノ丈夫ナル人ハ三日程ノ内ニハ自然ト愈ルモノ也天稟ノ薄キ人ハ三日立テモ格別ノ事モナク同ヤウニメ次第〱ニヨトロヘルモノ也右ノ薬ナクモ三日ノ内ニハ自愈ル処ヘ売薬ヲ用テ功ノアル〇モノ也右ノ薬〇ヤウニ見モ畢竟自愈スル也三日過ルモハ効ナシナト云事ハ彼売薬者ハ医者ヨリモヨク中風ノ事ヲ呑込タル事也

心痛

是ハ上焦阳気不足メ寒気内ニ結メ前ニツタ寸
ハ心痛背ニ徹シ後ニツタ寸ハ背痛モ心ニ徹ス
ルシ凡テ心痛ハ甚大切ノ者ニメ凡テ痛ムニ悪
候ニハ胸中心下其心中ノ痛ムヤハ甚アシキシ死
スルヿ速ナリ左カ右カエツキ痛ムハ真中ホト
ニハナシ胸中心痛ミニ胸イタム下ニ痛或ハ吐
血タ死スルモアリ先年モ胸イタミ半時斗ニメ
脉ナクメ死タリ又折々イタムヿ七年斗モ常持
病ニ痛ムニ側モ由断シタルニ則死スルモアリ

又卒胸痛メ手足冷厥メ脉モナクメ欲死赤石脂
丸ヲ煎湯ニメ用タレハ治タルコモアリ右ホノ
効アリ甚大変ニメ不可由断痛ヤウカ積気トハ
遠テ胸痛ト心痛ト胸上ト胸ノ下トニテ痛ムト
ヲ分ツ説イロ〱アレ圧古人モ急度ニハ分レス
痛処モ分レ難レ故ヱ先混ス来云初メカタガ痛
テ夜ニ由断シタルすハ下ニサカリテ死タル者
アリ又支飲ノ痛ハ又遠テ息タワレミミアツテ痛
ノ塩梅モ又心痛ニテ脉ノ止ルハ心藏破レルニ

依テ吐血ナトヲし死スル也心痛ニ或人ノ説ニ
山梔子ト延胡索ヲ等分ニ細末ニメ酒ニテ服ス
ルド大抵ノ絶汗出ル位ノ心痛ニテモ治スルト
云延胡サクハ雷公炙論ニ心痛ヲ主ルトアル故
じ又頭痛ニテ死スルニモ稀ニハアリトイヘド
未見随分アルマじキトハ云カタシ又九種ノ心
痛ハ一〆ケ様ニハ分チカタシ

胸痺心痛

金匱要略曰上焦阳気虚メ下焦ノ阳気実ニ上焦

ノ阳虚ニ乗スレハ寒気自然生メ胸中ニツカエ
フサガル故ニ胸痺心痛トイヘ𪜈此コトハ如何
ナルヤ不分今按スルニ胸痺ノ痛ハ多ハ心労ヲ
シタリ腹ヲタテタリ凡テ七情ニナヤマサレテ
胸ガフサガリ或ハ痛ムト云テ世上ニテ積気ト
云テレモウ中ニモ大分此症アリ又金匱ニ云胸
痺之病喘息咳唾胸背痛短気寸口脉沉而遅関上
小緊数云々此一条ハ昏中ニテ証ト脉トヲ論スル
大一ニメ上ノ如ク陽気虚ニ阳気逆ノ胸中ニ満

テ肺管不利ニメ息スルニ咳アッテ喘息ノ如ク
メ喘息カト思ヘハ肩ヲ揺ス症、子ハキ、唾ヲハ
キ胸背ノ間気フサガリッカエテ痛ミ或ハ気カ
引シメルヤウ痛ミ息ツキ短クメッヾカズ下ヨ
リツキアゲルキミモアル、脈ハ右ノ如沉遅ナル
ルハ上焦ノ陽虚ニ因テ、関上ハ陽ナル故陽気ノ
シツミフサガッテ胸中ニ実スル故ニ小緊而数
也此脈ハ今病カ如此ナル故、又胸痛最初ハ支
飲痰飲ト見テカエルナレ氏支欠トハ異ナルハ

足ナトヤ面部ナトガ少シ腫テ息タリシミモ胸
痺ヨリ強クメ横寝ナラヌ処ガ異ニ痰飲ト支飲
𪜈支飲トハ飲カ皇テ気カ滞ル又ハ痰ニテ胸痛
ムハ飲ガサキニタマツテ痛テ痰ヲ閉クカヨロシ
茱ハ半夏枳売ノ類カヨシ痰ト斗ト云テ導痰湯
ヲ用ハ非シ胸痺ハ水カ先下タマリテ気カヨリ
タル。ニテ気ヲ散スヘシ支飲ノ初メ咽ノ喘スル処
ハ喘息トモ遠テ支飲ノ症ハ治サヌシ又云胸痺
ノ症心中ニ飲或ハ痰飲等アツテ痞塞シ依テ気

結

帯結シ脈下ヨリ逆メ心ニ付只胸中シマリ気ヲ
遺フ丁アレハ痛ミ苦シ津液一身ニ布丁不能メ
凝唖トシタルホノ症ヲ胸痺ト云テ凡テ
右ホノ証ニ人多ク湯枳実薤白圭支湯ヲ用此方用
イ場所不分シ甘ヲ好ム人ハ人参湯苦ヲ好ム人
ハ枳実薤白圭支湯ホヲ用ユ此ニ方ハ主治モ同
ト云シ薤白圭支湯ハ方枳実厚朴ハ気ヲ下シ満
ヲ除ク薤白モ下気圭支ニテ逆気ヲ下シ栝蔞実
ニテ結ヲ散スル丶人参湯ハ人参ニテ陽ヲ補イ

気ヲ下シ甘中平並テ中ヲ温ノ気ヲ散シ白朮津
液ヲ輸化スル也此方ハ傷寒論ノ理中湯肩此処
ミナタテ改テ人多湯ト出ス理中湯ハ中焦ノ乱
気ヲ理シ人多湯枳実薤白圭支湯ヲ用ル場ノ心
得ハ傷寒論所謂傷寒阳脉濇阳脉弦法當腹中急
痛先予小建中湯不差者小柴胡湯主之出太阳中篇ニ
此意ト同シコトシ○又胸痹緩急ノ症アル者ニテ
寒邪上焦ニ客スレハ痛急シ緩ナレハ痛エルシ此
胸痹ノ緩急アルニテ心痛ノ去来ノ義ニ意茲附

子サンゴヲ用ユ薏苡仁テ痹ヲ除キ気ヲ下ス附子
ニテ中ヲ温メ寒ヲ散スレハ右等ノ剤枳実厚朴
圭支干姜甘草附子ナド胸中ニ入テ熱物ニメ同
効ある栝蔞薤白白酒湯ナド・ハ用イスト云ヿナ
ケレドモ服シカタキ故ニ余リ不用

脾労病

本脾労ノ文字ハ本草綱目百病主治鍼砂ノ條下
ニ云治脾労黄病トアリ此ノ処ニ脾労ハ世間ニ
テ黄胖病又ハ俗ニフク病ト云病也此方ニテ其

黄胖病ニナラヌ先ヅ見遊テ動気高ブリ耳鳴ホ
ヒ此脾労ト云其侭ヲケハ黄胖病トナルナリ脾
労ハ丈婦夫傳染孫ヲ引モノヽ其故外臺ニハ痊
病中ニ入テアルヽ其元脾労ノ因ハ脾胃ノ濕熱
ニヨツテ黄ヲ発スルヽ此症ニハ灸治ハ効ナシ
反テ動ズルヽ夫ハ何故動ズレバ下地アルニ火
ヲスル故ヽ又脾労ノ病飲食過多ニヨルモアリ
凡テ此症ハ物ゴト苦シゴテくスルヽイカヽナレ
ハ元忌ヲ主ル故ヽ此病ム人ハ下地カラ肝膽共ニ

ヨリシ胆ノ府弱キニヨツテモノヲ決セズ右ノ症ニテ背エコリ痛ムハ七分半夏湯前証ナクメ耳鳴動気高キハ沈香降気湯心下フツクリメ食ナドノ滞レハ分気枳殻散又脾労ニテ下利スルハ腹痛ナク下ルハ香砂平胃散腹痛アツテ下ルハ玄武湯心下痞メ腹クワラ〱ト鳴テ下ルハ半夏瀉心湯又沈香降気湯七分半夏湯ヲ得飲マス若ニハ九味半夏湯又下血スル者アリ下症ニハツハリアツテ下血スルハ鉄刷湯又香艾湯金匱

ノ赤小豆当飯散ヲ用腫ルヽモ大体ハカマリズ
大分ニ腫ルヽハ安豆湯ヲ用ユ又衂血下血ハ目
的ニナラヌ吐血ハ変ナリ莎艾湯ヲ用ユヘシ〇
脾労丸云々丸丸散聞啓テ出ス〇消痞丸同断〇
脾ハ思ヲ主ルし今世上ニテ云カン積ノカン症
ノト云ハ此症し後藤氏香川氏ヨリカン症ノ名
専言し〇此痞ハ晴天ヲキラウし曇天モキラウ
し〇此症黄胖病ニナリタルニテモヤハリ此療
治ヲスベシ

脚気

一素問頑風温痺病源候命ニ初テ脚気ト云然レ𪜈病源候命斗ニテ方ナレ千金方ニ風毒脚気ト云テヤリサテ脚気ト云ハ[illegible]行之此病凡寒暑湿ノ気土中ニ鬱蒸シ結ヒテ病ノ気ヲナス章南ニテ是ヲ瘴毒ト云此レハ今医者ガ瘴毒ト云ハ悪モ但脚気ト云ガヨシ人脚ノ絡ニ感シ下ヨリナホリテ腕ニ入ル毒盛ナル寸ハ心ヲセム其如クシ脚ヨリ起テ上ルユヘニ脚気ト云ズベテ気ト

云字ノ付ル病名ハ奔気上気気急ニテ下ヨリ上ヘノボルシ七気ナトハ別シ名古屋玄意気字ヲ痲ト云字ニ見テ手ニ有ル寸ハ手気ト云テヨカルベキ也是ズザンノヿ不可従気ト云字ヲ付ルハ脚ヨリ起テ上心ノ蔵ヲセムルニ至ル故ニ気ノ字ヲ作シ風毒ト、風ハ天地ノ気シト云ヘ𪜈風ト云テ寒暑温𪜈コモルシ是ハ病ノ起ル処ニヨツテ作ル名シ又脚気脚弱トイウ是ハ風毒ニテ足ヨワクガタ〱ト〆歩行シガタキ故脚弱ト

云是ハ病症ニヨツテ名付タリ頑風温痺トハ脚ノ
頑弱トシビレヨワル故頑風ト云疼ツウトイタム
故湿痺ト云脚気方條ニハ嶺南痺毒ト有ハムカシ
晋ノ代ノヲトヒベテ江南ニイウ処エ都ヲウツシ
テ其土ト日ノ温ニシ痺毒多カリシカハナニカ
上方タウダイノ公卿タチ其湿気ニカンジテヲ
トカタ脚気ヲウレイタリ其ヨリ傳染流行ノ唐
リ世ニハ中華モ一ツトウ流行セシト云ヿ近年
々ニヨリテ梅雨中ニ雨シゲタ土用ニカケテ雨

湿去リカタキ寸ニハ時候ニテ人ノ皮膚開ツレ
ヨリ雨湿ニ感シ病人ノ言ニハ子ビエヨシタカ
或ハ時気ニアタリタカト云テ足ダルク尤コブ
ラノ外チキル、如クニダルクタトヘテ云バア
タゴマイリヲシタ如クニ足ダルクシバラクノ
間モツクバイナトシテ居ルカ又ハ大使ニカワ
ヤニイリテアトノ立シナニモ、ノアタリシビレ
ルヨウニナリ惣タイ足ヨワクナリテツマヅキ
ヤスク着物ナドノヌゲヤスキヿカ又ハ足ノカ

ウナドヲナツル寸ハツマサキノナテザル処モ
じりくスルハ是脚気毒こ是ノシビル、処ハ手
ニテナデ、見ルニ手ヌグイカ紙ナドヲヘダテ
タルゴトクニテヲオヘノナキニアラヌ有ニア
ラス但病人言ハ皮ノアツクナリタル様ニ覚ル
手堅。ナリ手ニテナツル寸ハ右ノ様ニナレ𪜈シ
ビレドウシヲスリ合ス寸ハシビレヲトクト覚
ルヽ此病身モチノ不亘人ナト又大酒又ハハタ
カナドニテイ子ル右ノトガメナト、覚テカマ

ワズ不養生ナムドスル人有リ心ヲセムルマテ不知故ニ不養生ノ人ナトハ病人ト斗リ合イタリメ療治スレハ医者ノ不調法ニナル者也親類カ又ハシタシキ人ニダンジヲキテ療治スヘシリウメ六ケシキ病ヲ病人キニイヽヲキテ療治スレハ急ニヲヨビ医者ノ不調法ニナリナカンヅク脚気ナドハ能々病人ノシタシキ人ニ云ヲカ子ハ衝心ノバニ至リテ二三日ヒマドルモアリ又ヒトサレコミシテ死スルモアリサミコムニ至

リテハ医者ヨリコトワリヲイウ間ノナキ者ゝ
能々心得事ゝ○脚気裏症ハ右ノ如クタン〳〵足
ヨリハレテ小腹ニ覚エナク小腹ガホリツ引ニテ
引シメル如クホリヨリ下ムチヤ〳〵シテ心ニヨ
カラズ小便淋瀝トシケクシブリ短ク胸中滿塞
不通シム子ガヘツハイニムナフタレシ塞リテ
氣力不通ヲ不通ト云時々トイキテモセヌカ又
ハ大キナアタビテモセ子ハ気ガトケユルマヌ
ヿアリ此心持ゝ病人タゝワカヘル〳〵ト云ハク

セモノ之是下ヨリ気ガノボラントスル下地之
表病ツヨウノムナサキヘツカヘントスルハ表
裏一度ニ病之サテ裏ト云ハ心下ハレカタリ服
腫満シ胃中街悸ト云テムナサキヘ何ヤラシレ
ヌ煩トム子イキレムナグルシク夜ニ入レハマ
スヽジユツナガリ一向寝入ラヌモノ之昏憒ト
タラクナクリ恍惚トウツカリトナリ身体戦悼ト
カラタウチガ中風ヤミノ如クビク〱トフルイ
鼻ノ中ガイガラクナリ口中ヘ熱気ガホツヽト

出テモノ、味カ甜クナリ胃脘逆満ト云テム子
脘服カハツテキテ下ヨリサシコム是ホヲ裏症
ト云〻〇サテ又冷疝ノ脚氣トハ上ニ云如クニメ
攣ナクスコシヨワツテ病勢サノミツヨカラズ
腿ノ内カ錐ニテサシハモノニテ切リソグヤウニ
疼モノ〻〇サテ衝心ト云ハ上ニ云如クニグリヅ
ライナヤミテ後セン〱脈強張リ心下右ノ如ク
カタク〻氣喘ト云テ氣息粗クセリミクハツト
云テ肩テ息ヲスル此寸脈多ハ短促ニ数困肉ト

モダヘノルシンテ見ルウチニ死ニサウナリ自
汗出テ不止モノ也是ヲ脚気ノ急ト云衝心ト攻
心トモ云也則上ニ云テ有ル脚気上気トハコレヲ
云也此バニナリテハ十人ニ九人マテモ死証也
○脚気ヲヤム人イチガイニ云カタケレトモ十
マヘノ黒クヤセタル人ハイエヤスク毒モカルク
ヌコエフトリタル人ハ毒気フカクシ○禁ツヨ
カラス毒気但足斗シビルニハ十四罙ノ千金广
黄湯テ用也又表症ニテ惣身腫多シビレ有ルカ

ナキカノヨウナル者ハ脉モ浮大ニナルハ越婢
湯ニテ汗ヲ発スル也是ハ表症斗也又ムナサキ
イキドウシクムナサキヾコリナド有テ煩モツ
ヨカラザルハ三果ノ半夏湯発レトモ薬ヨワシ是
ハ先裏症也又ムナサキヘツカヘドウ気モツヨ
クイキガタクシキムカツキ有ハ大犀角湯ヲ用汗
ヲ発ス又三果ノ半夏湯ヲ用症ニメ逆ノボセノ
ツヨキハ檳榔散モヨシ呉茱萸橘皮ニテ気逆ヲ
下スユヘ也脚気ノ人ハスヘテ結喉俗ニ云ノドノホトケノカタワ

ラ結喉ノ両方ヲ能々見ルベシ是ハ古人ノ不言

外也此所ノドフ気ノツヨキ者ハ多クハ上心スル

者也楓亭先生ノ脉候脉ヲ軽トス沉緊ヲ次トス

洪数ヲ下トス沉緊多ハ死ス洪数ハ生ク緩ハ治

セリ是ハ軽クメ治シヤスキヲ云ナルヘシ灸治

ハ風市次ニ伏兎次ニ犢鼻次ニ膝眼次ニ三里次ニ

上廉次ニ　下廉　絶骨一名懸鐘　右ハ外弟ノ通

リタシノ＼ニ上ヨリ下ヘスヘヲロスベシ奉タハ

千金方ニ有リ右灸所アマタデ病人タヘカタキ

時五外ニ灸ス伏兎三里絶骨三陰交○右五外ハ脚
気ヲ病者胸服髀皆能々禁スベシ
脚気養生禁物ヽ　髪サカユキ爪トル丁
湯ニ入ル丁　○脚気アル人温泉ニ入ル物
ヲクルシメ気ヲフサグ丁百日斗カタク禁ベシ
湯ニ入ル丁ハ半年モ断ノスベカラズ脚気ノアル
人温泉ニ入テ當テ問ズリ死スルヲ見ル慎テ入
ルベカラス房事ヲ犯ス丁酒ヲ呑丁第一禁物也
船ニノル丁冷地ニ立丁宴ノ間昼寝スル丁又近

所二三町ツヽ口〱ト歩行スルヿ是ハ血ヲメグラシ心ヲナグサムベシ

病後長〻足袋トハツチヲハクベシ尤夏冬𪜈ニハナスベカラズ脚氣膧満タルハ蓖广葉ヲシキ灸スベシ荊藿モヨシ金匱要略ニ蒼石湯ト云洗薬アレ𪜈不可用其故ハ洗テ疾ノ治スルヨリハカヘツテ温邪ヲタスケテアシヽ後世杉木湯ナトアレ𪜈勿論之一切洗ヒ蒸スヿヲ禁スベシ外臺ニ不可妄洗ト有リ至極ナリ

○禁物心得　酒　肴　餅　麺類　タゴゴ

イモ類　味噌汁一切ヲモキモノ不苦物

子ギ　黒豆　白豆　赤小豆　麦　生姜

酢　紫蘇　葉実　昆布　ホウキヾ

カモ瓜

○同心得　雨中　夜中　灸後

雨後

右ノ節歩行無用碁將棊腰立ルヿ長座スル

ヿ食餌ハ朝勝チ子弟昼夕イテイ腕セツドキマテニ食ジヨロカヘメニ仕舞ヿヽ

身持随分宜シクスヘシ　碁將棊無用久ク坐スベカズ
足袋ハツチ着用スベシ汗ヲ発スルヿヨシ汗ヲ
アトニ風ニアタルヿ宜カラズ○脚気ノ論ハ外臺
ノ蘇恭ノ論詳ニ尽セリ蘇氏曰春発如軽夏発更
重入秋少軽至冬自歇大約如此云々誠ニ如此春
ノ末ヨリ夏ニ至テハ多キ也非由腎虚向得卑湿
之上斯病尤衆云々今世上腎虚ニヨルト云非也蘇
氏ノ如ク神薬ハ不可用反テ悪シキ也今按随分
壮実ナル人ニ此病アル也此病ハ湿勝ハ腫満ス

風カ勝ト不仁スルヿ又千金脚門ニ风毒ト云テ
有此用ハ脚気ヿ又一症ニ唇ルニ山桝ヲタライ
タル如クナルモアリ此症ハアマリサシコム位ニハナラヌ
者ヿ風湿痺ノ類ヿ不仁セス先ヿ又面上モシビレ
ルヿ此等ハ广痺ノ気呆ヿ凡テ不腫ニテ指コムハ
死モアレドモ多クナシ稀ヿ乾脚気ハ少シ脂込ハ
腫満ノ症ニアリ病源ニ心下ニ動強ク又迎キ強
シ又脚気発スル才ハ張キル如ク思テ甚重メド
ウモナラヌヿ発レハ毒気ノ下ルソウナト覚ユル

シ凡テ脚気ノ一症ハマギレナキ者シ足ガワルク
冷ルシ上衝スルハ脉緊洪ニメ張シ此ヲ病テハハ
シゴヘ上レズ又下駄ニテモ足カクツイ〇ト早キ下駄ト（テ橋ナトカ難行雨天ニ）
トノ違アリ又坐メ立寸ハ膝上ガヽツクリトスル古高キ〇（本ニ履ニテ）
シ則脚気（ギク）シ洛湯スルハ悪シ金匱礬石湯ナトハ不
用ノ冬用脚足冷テドウモナラヌ寸ハ附子甘中
湯ニテ洗フベシ此ハ外臺ニ出ル又山椒ヲ袋ニ入
レ煎洗フヿモアリ又枇杷葉ナドヲ煮テ温フヿアリ
先右ノ法ハヨギナキ寸ハ用ユベシ金体脚気ハ

湿ニ得ル者故ニ沐浴足洗ナト悪キ也故ニ吾門
余リセズ又脉ノ下ルアリ腎脉ニナルハ悪フスル
ト指コムシ下利スルハ徳本モ云ル如ク凡テ利
病脚気ハ脾胃弱シ故ニ脉下ルニ下利スルニハ用
方ナシ只ナ全ノ甘艸湯ニ一ツ全治中ニ下利ヲ云
リ此方ヲ用ル斗ニ神薬也風引獨活湯ナトモ神
薬也独活湯モ似タル物也外ノ方ハ病源ノ脉状
ニテ分ベシ又灸ハ凡テ致スヘシ別ニ記
○風引獨活湯ハ脚気治リタル後ニ一体ノ形ノヨトロ

ヘタルニ用テ神フヽ何分此方ハ脚気ノ痿弱ヤ
丸テ脚気ノ強キ傷タスデテカヽテ用ヽ

○小鼈甲湯ハ其人元壮実ニメ身体コヘタルヤウ
ニ成テ余程ニ腫ナドモアリタリナドメ壮熱ア
ツテ心下ニコバ込テ臍下ノしびれルノハ此ヲ
用ユ心下杯コバムハ未エツクホドニモナラヌヽ

○延年茯苓飲ハ心下ニ指込テ気急アツテ喘ノ強
キニハ用ユ旋覆飲子ハ右ノ如ク喘カ目付ニメ
此方ヲ用タ上喘モ止タ後毒気下リテ腫気ニナツ

タニハ大犀角湯ヲ用ユ
○千金广黄湯ハ是ハ只シビレタリ或ハ腰ノスヽ引腫タリノ痛ミ脚気ノ最初ヤ終ユルキ𪜈ニ用莱モハタラカヌ之桜ニ脚気ノ内経名厥而漢名倭
○風宋齊ノ後謂之脚気湿痺古来索向ノ厥ヲ脚気ト云𪜈未詳慥ニ出ルハ千金方ヨリ初ル脚気発ハ上ミモ云如ク衆ニアレ𪜈世上ニ云如ク足ニ腫アツテ上ヘノボルハ脚気ト云ハ非之脚気ハ衆ニアリト云𪜈何レイタミアルカ引張カタイ

カレビレルカスルヿ以上ノ証ナキハ非脚気ヿ

△脉ハ数ハカマイナシ洪緊弦ナトカアシキヿ右ノトントナヘルハカマワズ又脉ノ毒気カ下ヘ下ルト足ノナヘルヿアリ随分治シ

○大犀角湯ナトノ如ク腫ノクルハ腫気ノ毒入テ栄衛ノ通シアシクナリ水ガ膀胱ニ不帰メ水気逆シ却テ膀胱ノ気カ輸化セズ故ニ一身ニ腫アルヿ

○又脚気衝心ノ寸ハ手ノヨキ外ナクモチヤくスルヿ此ハ心坙ヘ毒気メクルヿ又心下ヨリ烱

ノ如キモノホツト胸中ヘ上ル如ク又芘ヲノ如着ヒン〱ト上ルヤウニ覚ルヿ又痛ニハ非ス只十町斗走リタル如ク息タワシキヿ又只胸サワ〱トシ睫ヲ搼スルヿ不能一身ヘ一面ニ腫来リ小服不仁シ足モ不仁ス其足ハ一抔ニ腫ル也腫引ハ悪シ如此ナレハ三日中ニ死ス也其気急甚シケレハ甘遂末ヲ用テシ又呕気アラハ半夏大三水ニ合入七分ニ煎シ生姜汁ヲ少シ辛ミアル位ニ合メ服スベシ又横寝ナラザル寸ハ几テ午モ足

モサワラヌヤウニメモタレサシテヨシ
○紫ハ毒気集テ面赤クナリタルヲ下ス也古金ノ
上品ヲ用ユベシ煎テモ其目ハ不減之
○千金石羔湯此驚悸ト不可名状カ目付テ頭面上
テ赤クナリタワイモナキヿヲ云タリメ脚気色
々ト変ス又冬月足冷ニ火炉ニテアタルニ大強
キカ又ハ久シク當レハ上進スル気味アル也△脚
気ノ中ニ瘀スルアリ治スルモノ也瘀症斗リハ
不治也

奔㹠気

素問ニ云五藏積聚ノ内腎ノ積ヲ奔㹠ト云㹠ハブタゝ此金匱中ニ吐膿驚怖火邪ノ症ト同シ驚ニ因テ発スル寸ハ神ヲ傷恐スル寸ハ志ヲ傷ル神志ノ動気腎ニ積テ下上游奔メブタノ奔ルガ如ク故ニ奔豚ト名ク是ハ小腸ヨリ起リ上テ咽喉ヲツク発スレバ欲死シ気定テ奔㹠静ナレハ𪜈ニカエルゝ此症ハ小児癇癇ニヨリ侶タレ𪜈奔㹠ハ臍下ニカタマリ有テムクゝトメ上胸ヨ

リ咽喉ニツクゝ痛症モ臍下ヨリ心下ニツクナレ圧
其脉波ノ如クナルゝ是カ別ゝ奔トハ腎カ奔リ
コム也豚ト云ハブタハヨク奔レ圧遠ク行ヿナ
ラヌ故ニ上ミ胸ニツクゝ然ル寸ハ陽気搏聚乄
一身ニ布ヿナラズ乄腹中陽盛ニ乄痛ヲナスゝ
奔豚止ム寸ハ胸中宗気シマツテ直視スルモア
リ右ノ奔豚ノ症ハ外ノ薬ハキカヌゝ奔豚湯ヲ
用ユヘシ又千金ノ奔豚湯モ用レ圧是ハ常ノ積
気指込テ苦ヲ好ムニ用或ハ莪朮三稜ノイル症

アリ奔豚湯ハ苦ヲキライ又建中湯ナドノ甘ヲ
モ胸ニモタレテキライ其外ノ菜ニテモ呃カ有
タリスルニ奔豚湯ヲ用奇効妨之奔豚気湯ハ熱
一向ニナシ奔豚湯ニハ往来寒熱アルモナキモ
アリ奔豚湯ハ一病ノ用方之奔豚気湯ハ熱一向
ニナクメ一切ニ痛ニ又圭支加圭湯モ用此ハ奔
豚気湯ト同シ圭支ヲ加フルハ奔豚ヲモラス之

蚘虫

此症ハ世上ニテ凡テ烏梅丸ヲ用ルナレ圧人体ノ仲景ノ意ヲノミコマヌ故ナリ烏梅丸ノ症ハ吐スルト不吐トニヨラズメ阳阴不相順接メ下利スルヲ治スル之近代コレニヨツテ蚘ヲ吐シサヘスルト此方ヲ用モト此方ハ厥陰篇ノ主治ニメ手足冷ニメ吐利ノ内ニ蚘ヲ吐スルモアレ圧蚘虫ヲ治スルノ主薬ニテハナシ凡テ蚘虫ヲ下スニハ鷓胡菜ヲ用レハヨク下ル也又徳本大乙丸ヲ製

痃ノ虫積ニ用イ水香丸ヲ冷症ノ虫積ニ用トアリ瓦テ時疫ノ人参羪栄湯ニ太乙丸ヲ加テ用ルヿモアリ

癰

癰ト云ハ全体疔ミムスレハ大キク出来ル之毒
氣カラ集リクル之灸ナドガイボイ火毒ナドヨリ
発スルコアリ是ハ格別大キクナラザルナリ先
ツ初ニ敗毒散ヲ用ユイヨヽナラザル寸ハ托裏
消毒飲ヲ用ユウミヲナスニ至テハ排膿内托散
ヲ用ユ外科ニヨリ千金内托散ヲ用ル有ドチラ
ニテモ余リ違ヒナキ之瘡ハ外科ヲ主トメ医若
ノ方ハ下タエツクガヨシ何ヲ云テモ外科ノ方

ガアタリツケテ居ルユヘニヨキヾ皆ナド丶ニ腫物アラハ背中ノヌイ目ヨホトキテ其外ヨリ見ルベシ度々カタナドヌガスル丁ハヨロシカラス風ニアテル丁ヨカラズ凡テ瘡ハ甚強キニ随テ次第〳〵ニクサリ腐肉ト生肉トノサカイヘ大底モグサヲ大指ノ大サニシテ灸スベシアツキヲ覚ユル外ヘスベシアツヾナキ外ヘスヘテモ如ナシアツキ外ヨク〳〵考ヘ其外ニスベシロノアカザル寸ハ腫ノセタカクナクリテ茶碗ヲアテタル如

ク高クナルヿ其外ヲサヘ見レハカタヿ其カタ
キ内ニモ其上ニヨヽシテ見レハヤワラカキ外
アリ其外ヨリ口アクヿロアケハ焮モゲンスル者
ナリ膏薬ナドヲハリカヘル才ハ下タヨリ湯ゲ
立テ腫物ノニヲイツヨキ者ホドヨヿ皮アツニナ
クテ平頭ノモノ是ヲ疽トス癰ニ比スレハ療治
ハレニクキ者ヿロノアクマデモヨホドヒマノ
入者ヿ癰ハ左様ニヒマノ入サルモノヿ癰ヲ見
ルニ口授アリ手ヲ入レテ見レバアツミヲヽビ

強者ヨリ不食スル者ハ一向不治△虚恚ニメアリ
ミ少ク湯ゲナトモタヽザルハ難治是ハ十唫（全）大
補湯ニ加附子ヲ用ユナリ

目

逆上之強キ人ナドノ急卒ニ目赤クナリ或ハヤニナド出テ明ヲ見ルニ堪ガタク是ヲ羞明ト云痛ナドアルモノヤニナド出ル者ハ是ヲ外障ト云テ易治シ是ハ胃中ノ熱ヨリ多ク生スル故ニ薬ハ前胡瀉肝除熱湯ナトヲ用眼明散ナドヲ用眼明散ナドヲサスモヨシ眼明散ノシユムニ不堪モノハ秦皮黄連前胡雞人ノ四味木分ニメ沉香アラバヨシ凡テ目ヲ洗フドスモノハ洗薬ヲ少シ宛

取分テ洗イ其佗ヒ捨ヘシ洗モノハモミノキレニテ洗ベシ洗薬モ余アツクスルヿ宜シカラス塵眼ナドニナリテ湯ゲニテ目ヲムスヿアリ是ハ症ニヨル之目ノヿハ大抵諸方ヲ考エ用テ暫ク試テ功アラサル寸ハ専モンノ眼科ニユヅルヘシ本科ニテスル外ハ風眼カ又ハ塵眼ニテ不痛不痒格別シヘナドニモジく／ト悪クナルニハ滋腎明目湯ナドヲ用テヨロシキアリ左様ナヿハ療治スルモヨシ内障ナドノ類ハ眼科ニユヅルヘシ

風眼ノ養生ハカミサカヤキ湯ニ入ルヿコタツニ
アタルヿ怒気ヲ発スルヿ強キモノヲ食シ臭物
ナトヨロシカラス凡テ目ニ星ノ入タルハドウ
ジヨリ上ミニ出来タルモノハ多シハ内障ヨリ発
スルナリ難治ドウウドジヨリ下ニ出来タル胃
○焮ノ薫蒸ニヨリテ出来タルヿ故ニ易治大テイハ
眼明散ニテモトレルモノ也星ト云モノハドウジニ
サヘカヽラ子バ。シバラクノ。中ニ。治スルモノ也△大
頭痛ナドニテ。頭痛次第〱ニ。ウスラグニ。随テ。眼

氣ナドモスクナルモノハ見ヘ遠クナリタルモノ次第〻ニ明ヲ失スルモノ何ホド薬ヲ用ニテモ不治モノ也大頭痛ニテ目ナド赤クナリタルモノハ病人エ言フハ氣分ニサシカマイニナル物ユヘハタノ人エヨク〻云置ベシ左ヨウナドモハ酒製防風通聖散ナドヲ用ベシ右ノ薬ヲ用テ百發百中ノモノナレドモ病家エヨク應對ヲセザル寸ハ。右。ヤウク。ハゲシキ薬ヲ用ルニヨリテ。失明スルナド〻云テ大ニ眼(ウラミ)受タルヿアリタトイ眼ナド何ヿヲナケレ

𪜈大頭痛ノ人ナドハ此頭痛ガヤミテメドカアシクナラザルガヨシト云ヲクベシリウシテ目ナドアシクナリテモ格別ウラマザルモノナリ

○雀目(トリメ)早クウナギノワタヲ食スベシ殊ノ外早ク治スルナリ

○風眼ト云モノハ夜分久シクヲキテ居タリ或ハ火ノハタニヨリテ或中ノ焚ニヨリテ瞼ルナリ眼爛黴瘡ナトニテ目ノ悪ナルモノハ目ノ薬ニテハイカスシツノ療治ヨシ。土茯苓ナトヲ久ク用ユ

ハ血カ乾ク故ニチリ上ルモノヽ凡テ目ノ見エルヌヤウニナリタルモノハ再ビ不治モノヽ先ハ頭風神古ナドヨロシ甚クナル寸ハ酒製防風通聖散ヲ用ユ

腸癰

此ハ小腹ノアタリニフツト腫テ外ニ見ルヽ凡テ金匱ニ詳ニ載タリ然ニ金匱集解裡雲来ノ説ニ大腸癰小腸癰ノ分ヲ云リ今病人ヲ見ルハ其如ク小腸癰ハ臍ノ上ニツキテカタマリ出テ一寸見レハ積

裂ト見チガウヿ膿トナル中ハ臍ノ内ヨリウスキ
アラウミヲ出ス強クナルト臍ノ内ヨリ走ルヨウ
ニナルナリ夫ハ凡テ膿トナレハ不治ノ候ヿ大
腸癰ハ臍ノ下小腹ニカタマリ出来テ横痃ノ外
ノ少シ上ニメモヽノ付根ノ辺ニ付テナルヿ此
ハ大テイ治スルヿ此ニテハ臍ニウミヲ出スニ非
スメ大便ニ赤黒キナメノ如キ者下ルヿ大黄牡
丹湯ヲ用テ血ヲ下ストイヘ𪜈血下ラヌヿ此病
ハカタマリタル中ニ引張テ常ノ塊トハ違フテ

膿トナル寸ハ発スル也此カ目付也金匱裡氏ノ
説ニメ用ユレハ薏苡附子敗醤散ヲ用ユヘケレ
𪜈敗醤未詳故ニ丸テ大小腸癰共ニ大黄牡丹湯
ヲ用テヨレ流注ハ大方虚症ヽ腸癰ハ大テイ實
症也右ノ如ク腸癰ト流注ト違アレリテ大腸癰ハ
小使如淋赤渋塊ノ発セント欲スルマエ其塊ノ
発スル方ノ足引ツク発ツヨク小腹痛其未潰マ
ヘ腸癰タルヿヲ知ラハ先大黄牡丹湯ヲ用ユヘシ
服之寸ハ其夜大腹痛スルモノ也発レ𪜈忍テ是ヲ

用ルヿ二三日ナレハ血或膿又ナメノ如キモノ下ス也如之スルハ痛モ止テ不日〆治スル也此ハ潰レハ先治シカタル者也未潰ハ治シ易シ凡テ腸癰ホニ類ノ分別シ難キニハ凡ハ呆症気ヲ用レハヨシ此ハ瘀血ニテモ水気ニテモ小腹一切ノヿニ能効アル方也又皷脹ノ如キニメ臍下ヘ一面ニ痛テ常ノ腹痛トチガウハ此欲為腸癰也能々詳ニスヘシ○凡テ小ガサヲ渾述テ瘡ト云夫ヨリ一ダン大ナルヲ後世癤ト云即今云子ブト也

又夫ヨリ大ニメ一寸以上ナルヲ癰ト云此後ニ癰ハ背斗出来ルト覚ルハ非ニ癰ハ壅シト云テ経絡ノ凝テ発スルニ背ニデキルヲバ発背癰ト云腹ニ出来ルヲ腹癰ト云又腸中ニ出来ヲ腸癰ト云節ト混シ易シ子ブトハ大ニメ根シマリテアルニ癰ハ小ナレドモ根シマリナク大ナルニ故ニ癰トハ一寸以上ノヲ云〇金匱ニ腹皮急ト云此ハ腹ハ胃及大腸ノ居処ニ故ニ腹皮急ナルヤウナリ今腸癰アル故ニ如此覚ルノ然レドモ按甲ズ

ルニハ急ナラズ只其人ナルヤウ覚ルノミ此按ハ反テ軟ク又腹中ニ積聚アル中ハ急ナルヲ覚エ今ナレ故ニ腸癰ナルヿヲ知ルヘシ又身尺甚ナケレモ脉數ナル腹内ニ癰膿アルヿヲ知ルヘシ先腹皮急カ目的シ此ハ但皮ノヒツハルモノ之ホ腹ヨリ右助ヘ拋ニモアラズ但ツヨクカタマリヒツハリアリ大ハ小腸癰也○大腸癰ハ助エハ不来古ノヨコ子ノ外フツト腫小腹ニヒツヽクヤウニ痛ヲ云○疝氣トノ分チハ疝氣モ急ニ足

膵エ引ツケ、ノビザルナレドモ、サスリ或ハアタヽメ
レハ治スルく寒疝ニテモ疝気ニ似タルモアリ
腸癰ハ遠テサワレバイタムく始終足ヲノハスヿ
ナラズカヽメルく腸癰ノ足ノナヲルハ自然ナ
ヲルく○大腸癰ナレバ下ノ股ノツケニ吟ガア
ルく小腸癰ナレバ臍ヨリアタく口ノアクマヘ大
ニ痛之○凡テ腸癰ハ初メ焮ツヨク渇アツテ痩
ミ甚混シヤスシ此モ小便数脉皮急ニメ右助ヘ
引寸ハ腸癰ナルヿヲ知先柴胡圭支湯ヲ用ユヘシ

○凡テ塊ナドアリテ不分ニハ八味疝気ヲ用テ
四五日ノ中ヲ経テ熱アルハ牡丹湯ニテ下スヘシ
○凡テ虚症ノ人ニ如此ノ症アラハ先流注ナラ
ンヿハカルヘシ実症ノ人ハ腸癰ト知ルヘシ然レ
𪜈腸癰ニハ小便如淋痛アリ能々機ヲ察スヘシ
如淋ニメ数ナレ𪜈淋疾トハ遠ヿ也淋疾ハ茎中
イタム腸癰ハ不痛メ但数ニメ通シカタシ

肺癰

此症ハ気塞テ不通熱アツマツテ肺積之金匱ニ云口中辟々トメ燥咳シ胸中隠痛カ第一目的之又初前可救ト云ヘトモ此症ハ不治之此症ハ最初ヨリ臭腥メ咳逆メ息タハシク胸ヨリ咽ヘサシ痛ム夫ヨリ吐膿血也膿ハ一通ノ膿トハ異ニメ譬ヘハ臭気カ水ヲ花立ニ久ク貯テ腐水ト成タル如クイヨ〳〵久シケレハ一間ノ中モニヲヽ之一通ノ疼ハ只子バツテクズノ如クナル之労咳ハ

只一通ニ唾ノ子バリタルヿ肺痿ノ症ハトロ、汁
ノ如シ此ニテ分別スベシ又別ニ一症アリ今世
上折々アリ肺癰ノ如咽ヘツマツテ膈テモナク
欬モ出膿血盆ニ一杯モ吐症アリ此ハ驚ルニ肺
蔵ヨリ上ニ癰ノ出来ルヿ又此症ニ似テ急死ス
ルモアリ右ホハヨコ子ガナラヌヿ不治ノ候ヿ
凡テ肺癰ノ脉ハ楚上焦ニアル故数ヿ或ハ数実
ヿ〇又口中辟々ノ氣譬ハ小児ノ弄ブエノコハセ
ノ如キ者ガ肺管ニテデキルトミヘテ其声ヒウ

クトナルヿ此症ハトテモ不治圧先外臺ノ桔梗白朮散ナドヲ用テモ一段ハヒラクヨウナレ圧又アツマルヿ治驗ナレ此症ニ似タル者ハ治スレ圧イヨ〳〵此症ナレハ不治ヿ又千金葦莖湯モ肺癰ニ用ユ瀉白散ヨリ弱メ随分用イハスレ圧余リ効ナレ瀉白散ハ肺癰又ハ肺癰ダケノ熱ノアル咳ニモ用葶藶枎羸ト同シ義ニテ熱ヲサマス之

肺脹

此ハ肺癰ノ水雞声ナキハ肺脹トナランヿトスルキ

ザレヿ此ハ肺ノ葉アッテ夫カ上ニ浮ミハルヲ云ヿ欬而上氣ノ外ハ支飲ニ似タレドモ寢ナッテイキヨイツヨク卒ニ発スルヿ支飲ハイキダワシク起居ニ痛ミアル肺脹ハ治スルヿ後ニハ面浮腫ニメ又ハ足モ腫アルヿ此人ハ目ノ脱スル状ノキミアルヿ越脾加半夏湯ヲ用ルハ小青竜加石羔ヨリ焚盛ニメイキダワシミアッテ腫ノアルニ大一用ユ此方ノ石石羔ハ大青竜湯ノト同シヿニテ又腹雷鳴ニ用ルニテ喘氣ヲ下スヿ又

胸中痛テ缺盆ニ引症アルモノ乙

肺痿

痿スルニ色々アリ金匱肺痿篇中ニ弁スルヿ詳シ痿ハシボムト云テ乾キシボムヿ故ニ肺ノ津液四方ニ布ヿナラズメ其精液胃中ニ留貯メ得焚炙熬メ変メ涎沫ヲナス肺ヲ侵セバ咳唾不止メ乾モノハ自乾唾ハ自唾トナツテ肺痿ノ本病トナルシ此病ニ冷焚ノ二証アリ今病ハ多ハ焚証シ然レ𪜈証ニ同ジキハ涎沫ヲ吐ス症也分別ノ症ハ咳不咳トシ金匱千金外臺ホノ古方書肺

瘵論中嗽症ヲ論メ用方属嗽ナシ初テ聖剤惣録人多ク養栄湯ノ主治中ニ云リ故則嗽アツテ咳強ク或ハ吐血シ声シワカレテ虚労ニ佀タル症ニ能ク似タレ𪜈人多ク養栄湯ヲ用此方ハ咳嗽一目的之本虚労ハ不治レ𪜈虚労ノ風ナルハ吾門ニテ秦艽扶羸湯ヲ用ユ右ノ証ト能ク佀タレ𪜈秦艽扶羸湯ハ咳ハ一通ニメ嗽第一目的之右人多ク養栄湯ヲ用ルハ大抵不治ニメ長引テ薬ヲ代子ハナラヌ寸ハ聖剤ノ知母茯苓湯ヲ代用ユ症ニ分別

ハナシ凡テ右等ノ方ヲ用ル症ハ虚証ニメ食モ
大抵食ルモ不治ノ者ニ之後世虚労肺痿ト云テ右
等ノ症ヨリ相混雑スル之冷熱虚労凡ニナルト
ハ如右分于可療之属冷証ニ肺中冷テ気虚メ津
液ヲ温布スルコトナラヌ津液聚リ化メ涎沫トナ
ル故ニ唾多出ス雖然熱症ホドハ唾モ凝テ重濁
ナラヌ之咳モナク咽ノ乾キモセス必遺尿小使
数ナル症ハ甘草乾姜ヲ用甚奇効アリ此ニ某ハ
肺ヲウルヲス之傷寒論ニ大病後喜唾スル者

ハ理中丸ヲ用ト同意ニメ彼ハ胸上ニ寒アツテ脾胃ヲ浸ス故ニ人多白朮ヲ用此方ハ肺中冷ル故ニ呆ヲ用ユル之又涎沫ヲ多ク吐ハ圭支去茯苓加皂莢湯モ用ユ又炙甘草湯モ用ユ此ハ外臺ニ初テ用甚妙剤之仲景ノ大補藥ニメ大体右ノ症ト同シ肺気虚冷ノ涎沫吐出セシトメ心中ニ聚リコツテ悪心ノ気呆ニ用此ハ血脉ヲ復シ燥シタルヲ潤スル用先ハ唾血ヲ治第一シ右ノ三方熱ナキニハ用ユ今多クハ人多養栄湯ノ症

ニメ冷ノ症ナレ有タレバ面白モノヿ右ホノ脉
ハ凡テ滑数ニ虚之肺癰ハ数實トテ分テリ此篇
ノ論ハ詳金匱要略又肺痿ノ症ニ咳ナケレハ労
咳ト云ベカラス右ニモ云如ク侶タルモノヿ又
労咳ニテ声ノカル丶ハ肺痿ニ属ス又労咳ノ脉
脹ハ蓁艽鱉甲散ニ檳良ヲ加エ用ユ金匱ノ千
金生姜甘草湯ハ即前ノ千金甘草湯ノ一異ノ方
中ヨリ其方ヲ廣メテ肺痿ヲ治スルヿ此レ生姜
甘草湯ノ證ハ金体胃中ノ津液モ上肺ニ上リツ

キ胸咽ノ間カヽワキテ耐カタシ故生姜辛ニテ乾ヲ潤シ余薬ハ胃ニ入テ津液ヲ生ス随分右ノ如シ生姜甘草湯炙甘草湯甘草乾姜湯ノ諸方ヲ用モキライテ咳ナクメ濁唾ニモナク口唾ヲ多ク出ノ病ニ於テ千金桂枝去芍薬加皂莢湯ヲ用テ奇効アリ此方ノ皂莢ハ涎ヲ利シ寝ヲ通メ涎沫ニテ肺ヲフサガヌヽ故右云如ク奇効アルヘシ

乳癌

乳癌ト云ハ乳ナドノ出ル婦人ナドニアリ多ク

アルモノニメ乳ナドニ肉ノ盛ミノロノヤウニナリ
次第〻増長メ初メハ寒熱往来アリ後ニハ熱ニ
キワマル〻サイ初ワカラザル時ハ敗毒散ヲ用テ
ヨシ乳癰ノヨウスニキワマリテヲシ見ル時ハ次
第〻皮ノ色ヘ出内ニ膿有ヤウスニ見バ十ニ某
ノ牛房子湯ヲ用ユベシ潰癰ノ後ハ排膿内托散
ミテ千金内托散ナドニテモヨシ又大抵腫物
ノイキヨイ不盛者ハ初ヨリ終マデ牛房子湯ニ
テヨシ大抵五六十日モカヽル者也又乳風ト云

着アリ胃ノ府強キ婦人ノ乳ノワクヿ盛ナルニ
ヨツテ小児初生乳ヲ吸ヿスクナクユヘツマツテ
フルウヽ乳風ハカタヘコルヽ是ハ敗毒散ヲ用
テヨロシ又乳岩ト云アリ是ハ初ニハ右モ左トモ
キワマラサルヿアリ乳豆ノサキニ指ノアタマ
ホドノカタマリ出来イタマズカユカラズ右ユヘ
病人不知ヿトヲコリタル処ヲ見付ケ半季過キ
一年スギテ次第ニ増長スル者ヽ乳岩ト心得テ
ヨレタンジニ日ヲヘ年ヲヘテロアキテ堅硬ノ如ク

ニメザクロノハゼタル如ニナリテイツマデモ愈ヘザル者之ロノアクマテ三年斗ロアキテ又三年斗ナリテ死ニ至ル也薬ハ柴胡養栄湯益気養栄湯ノ類ヲ用ユ次第ニ気血ヲトロヘルニイタリテハ十全大補湯ヲ用ユ乳岩ヲサイ初見付テ六七年モアリサホドニナラバ治スルヿモ有ソウナレ圧ドウメモ不治至死也外科ナド色々ニアシモ之ヲ云ヘ圧ツイニ治スルヿナレ膏薬モ大抵ヤワラカナル物ヲ付テヨシ○ノドノ下ニ出

来ルニ失栄ト云有リ後ニハ乳岩ノ如ニナリテ
死ニイタルナリ

疔瘡

初ハ敗毒散㚘毒盛ナル者ハ黄連解毒湯

時毒

癰疔ノ類ノ軽キヲ云々

臟㾮毒

是ハ十メノヤウナ者血下ル々多ク死スル々

脘疽

ドウモ仕様ノナキモノナリ

皐

皰ノ上ニ赤クザクロバナト云皰ノ上斗リ赤ク紅ヲヌリタル如クナルアリ是ヲ酒渣皰ト云外科ナド見ルトキハ密陀僧軽粉ノ類ヲ用テ付クルヽ銀杏ヲスリツブメ毎夜〳〵付ルトキハ百日斗モタメシテ次第〳〵ニ赤ミ薄クナラハ由(ヨシ)尤ナクハ強テ療治スベカラズ

皰瘡

酒ナド呑人ニ多クアリ一度付薬ヲ傳ルトキハ治スレトモ又出来〳〵メ先裏ニ至テ独リ治スルヿ

外科ナドニ見スレハ糸ナドニテシメキルモノアリ不苦ヿ

口瘡

升广蔑能キクナリ

唇

緊唇ナヲラヌモノナリ

舌

舌疽三年ホドカヽリテ死スル也薬ハナシ

喉痺

世俗急候風ト覚ルモノアリ発斑疫ニ類ス不食
咽候腫痛スル者アリ一二日ノ中ニ咽喉フラン
スルナリ急候風ニアラズ疫毒ノ咽喉ニ発スル
モノニシテ霊秘ノ瘡疽篇ニ出タル猛疽ナラン歟
モ霊秘ニ治方ナシ天花粉ヲ多メ入菉時疫程ノ
斑ツヨク咽痛ムト云モノ吉ヲヽサヘテ能咽候
咽ヲ見ルニ腫モナクウミクサキト云者是猛疽ノル
イナランシ

附骨疽

ニクスクナキ外イタミハレルナリ後ニハサリ
出スルく薬ハ大防風湯ヲ用ユルくタマ〳〵治スル
モアリ多ク不治く

瘰癧

薬ハ益氣養栄湯氣血ノウツタイニヨツテ生シ
タルハ不治楊梅瘡ニヨツテ出来タルモノハ治ス
ルく温疝ナドナキニルイキヲナスハ治シカタ

キ之

丹毒

膚全文ノ如クナリテ出来ルモノ之

痺症

痺症ト云者アリ是ハ身体ツメタク節コワルモノ之蠲痺湯ヲ用テ治スル之脚気ハ気分キツクアレキ之痺症ハナニトモナク惣体シビレル之

脳漏

清上防風湯 全体ノ外ハ頭風神方ヨシ大抵不治ノモノ也

天泡

敗毒散ヲ用除湿胃苓湯ヲ用 水多キモノニハ鉄合黄連末等分ニメフリカケル也風ニアタルヲ忌ム

小瘡

小瘡ノ療治ト云者王道ニテスレハ消風散ヲ長ク用テダン〳〵ニ盛リ惣身ニ出テ膿水ヲ流スヤウニナレハ蒼朮ヲ大ニ二杯ホド一服ニ入テ用ルモヨシ是ハ蒼朮ニテ水ヲ乾ス心〻如此メ四五十日ニハ盛リアリテ熱少々ヅヽソウ着ナリ発レ圧皮膚ノ間ノヿユヘヨホドノ勢アレ圧風寒ニ当テ肌膝ヲトヅルヤウニナル寸ハ内攻スルモノ〻氣急短息スルモ喘氣ヲ帯ル者〻是ハ後世

家ニハ赤小豆湯ヲ用ユヘレ𪜈効少クナレ余家ニハ
脚気門ノ十六案ノ大犀角湯ヲ用ユ此薬ヲ用テ
汗ヲ発スルヿ右ノ内ニ十人カ九人ハ治スル之一
人ハ脚気ノ心ニツク如ク成テ死スル者之右ノ
通ナレ𪜈勢ノナキ者少レ風ニアタリテモ格別
ノヿモナキヿ寒気ノ時分ニコタツナドニテ蒸
ヿヨロレカラス其内永久出盛ヲ乾キカケルハ摘
ノ薬汁ニテカタ手ツヽニ洗ベレ湯ニテ洗ヒタル
跡ヲ風ニアテテルハアレケレ𪜈包ミ廻ストキハ洗

サルモ同シ但シ楚ナキトキニ洗ベシ其洗タルア
トヘ繃扎丸ヲスルすハ能消スルナリ又瘦タル
人ノ氣血少キ人ハ乾燥メウミモナサス俗ニコセ
ガサト覚云イウモノアリ是ハ何ホド消瓜散ヲ
用テモ発セザルモノ也是ハ思ノ外ヒマノ入モノ
ニメ當帰飲子ヲ用ヘシ格別ニ内攻ナドニ至ラ
ザル者ハ小瘡食養生白カユヲ食フヘシ
臭類ヲ忌軽キモノ食ス食養生悪シキすハア
トカラムラ〳〵ト黒クナルヘシ

風疹

腰痛ニ当皈黄土木（山ノキイナツチ）分ニ煎シ用

失栄癭瘤ノ類

手ニテヲサヘミテ中ニザク〳〵脉ノウツモノハ

不治之脉ノウツハ何故ナレハ本経ニアタル故也

灸瘡

イエカヌルすハスイ玉ヲ以テスリスナリ

漆瘡

ヅガニヲタヽキビシヤイテツケルヨレ急ノ間ニ合サルすハ乾ケルモノヲ付べし

指甲瘡

急ニ針ヲ入レハアレヽ地ムレヲスリテ指ヲ巻ヨレ

疝気

疝気ハズベテダイシナキ者也其内イシノウヘニサシコミテクル者ハ五十人ニ一人死スルヿ○ヒ汗出サシコム者治シカタシ又一ツニ寒疝賍痛ト云者有リ初テヨコル寸ハ十ニカ知レヌ暑中ナドニフトヨコル者ヿスベシキ外ニイ子腰ヲモミユル賍ナドモヒヘイタミノツヨキ寸ハ大便ノモヨウシ有テカワヤニ上ル圧不通但痛ムニシタガウテイキタキヽミアリ左様ナル寸ハ

附子粳米湯ヲ用温ジヤクニテ臍ヲアタヽメテ
厥カヘル乙効ノアル者乙古昏ニモ寒疝ホツヲ
メグルト云有リツヨクミツヨクナリテ心下ヘハ
ル者ハ大建中湯ニアメヲ入テ用ユ附子粳米湯
附子解急湯三呆ノ建中湯大建中湯コレヲハ寒
疝ノ薬ニモアラス腹中ノ寒気上レヤウスルニ
備リ用ユヽ右ノ薬ナドヲ用テケツモカヘリテ
脉モ復スル寸ハ少レク楚ノ出ル者モアリ左様
ナル時ハ柴胡圭支湯ヲ用ユ金匱ニ寒疝腹痛ニ。

用ルモヨシ又寒疝タチニテ腹痛ナク腫ヘ張リインノウナドヘ張虚症𪜈見ヘサル者ハ八呆疝気方或ハ牡丹五等湯用テ下利ヲトル𪜌ハ気ヌケルナリ総ベテ気ノ字ヲ付ルハ下ヨリ上ヘノホルヿ〱寒疝腹痛ハ下スヘカラス其外ハ下メ七八ハ治スル者也

痔

痔ト云者ハタイテイナブラサルガ宜シトウザ〱ノヿヲメ居ルカヨシタイテイ秦芁防風湯又

秦艽蒼朮湯用テヨロシダツコウト云有リ肛門
ノ下フチヘ出ル者也是ハ神中益気湯提肛散ノ
類ヲ用テヨシイロ〳〵ツヨキ薬テ効ナシ又ハバイ
毒有ル人ナトニテハ痔ヲナヲスト咽喉ナドヿ
ランスルヿア也リ左様ナル寸ハ難症トナル也

傷損

傷損ハ凡テ高キ処ヨリヲチ或ハ物ニヲサヘラレムチナドウチテ血ヲ吐クモノハ不治是蔵ヤブラル、ユヘニ雷ニウタレタルモ如此

湯火焼

湯火焼シタルハ火ニテヤケドシタルハ酢ヲカケルヨシスベテ種ノ油又ハ馬ノ油モヨシ

黴瘡

黴ノ字ハカビルト云字ニテ肌肉エシユニワクユヘニカビルト云ゝ毒四肢ニ散在メ出様ヤコマ桃ノ熟シタル如クナルヲ楊梅瘡ト云又細カニメ出タルモノヲ砂仁瘡ト云此外ハ出ル外ノ形ニヨツテ名クル者ゝ先初ハ下疳トナリ下疳横痃骨痛トナルゝ下疳サイ初陰茎ニ粟粒ノ如キ者出テ次第〳〵増長メ膿水ヲ流スヤウニナル者ゝ左様ナル寸ハ下疳初起ヲ療スル解毒湯ニ土

茯苓ヨホド入テ用ルモヨシ外科右ノ下疳ナド
見テタイライカシ○フラト云テ白キ膏薬ヲ用ル
ヽ右ノ膏薬ニ松脳ナトノ句ヒアルト見レハ病
家ヘヨクヽ相對シメモシ右ヨウノ者ヲウカヽ
ト療治スル時ハ両方ノ左右ノ肩ロノ外痛ミ出
テ骨痛トナルヽスベテ下疳ナドヽ云者ハ初メ
膏薬ハ○アボス○バジリ○ナドハヨロシアボスハ○タン
ハンノ入薬ヽアボス斗ヲ付ルトキハ痛ミタヘガタ
レスベテ腫物ニ痛ヲモツ時ハ其外ニ熱ヲモツ

之右ヨウノ膏薬ヲ付ル時ハ早クシスル之早ク
治スル時ハ骨痛トナル之ト病家へ云ヲクベシ
左様ニナケレハ外科ハ匪者ノアヤマチノヤウ
ニ云ナリサイ初ニ発スル毛ハ小豆粒ホドアリ
タル物ガ其外ヲナヲメ別ニ又発スル寸ハ大豆之
粒ボトニナリ又ヲシナヲシスレハ又発スル寸ツ
ラ豆粒ホドニナリ次第ニ大キクナルモノ之
初ノ解毒湯ヲ用ユ頭中ニ痛強キニハ頭風神方
ヲ用久々六七年ニモナリテ色々ニ療治コメ軽

粉モ呑シ土茯苓ヲ呑テ血燥シタルモノニハ萆薢
鮮四物湯ヲ用テヨロシキヿアリ今軽粉ヲ服メ
ヨダレヲ取テ療治スル方アレ圧是ハ先セヌヿヒ
咽喉フランシメ食不通者之陰茎ノ次〻ニ腐爛ス
ルモノヲ蠟燭下疳ト云ニ軽粉ヲ用テヨキヿア
リ軽粉モ多ク用テ涎沫十ト多ク出淡夢〻ニ羸
瘦スル寸ニテハ痔症ヲ発スル者即死スルモア
リタイテイ用イ圧成ベキダケハ用イザル方ヨロ
シ湿毒ニハ毒忌アリテ酒臭餅麵類ダニゴフナギツ

バノ類禁ズベシ第一房事ヲ慎ムベシ又横痃使毒
ト云テヨロコ子ノヿヽ両方ノモヽノツケ子ノ
節ヨリ上ニツキテ横ニナリタルヲ横根ト云足ノ
節ヨリシモヘ成リテ丸キモノヲイヌゴト云横
根モクダスヿアリテ消毒飲ナドニテクタシテ
ミレハ臓血ノ如キ者ヲ大使道ヘクタスト云ヘ氏
毒盛ナル者ハ多クダシテモロアク者之○病人ヨリ。此四字十ク
ツノカワリニハ下シタル者ハロアキテ後ナヲ
リ早キ者ヽ病人ヨリ横根ヲ下ストト云ヘハノタヽシ

ヲ、セタラバロガアカヌモノカト問ヘハ是ハ請合エズト云置ヘシタイテイ丈夫ニ張出メ膿水リ多ク出ス𪜈ハ湿毒ソレヨリ減メ夫ニテ湿気断絶スルモノアリ夫ハ十人ニ一人ノミタイテイ身持ナドアシキ人ハ年ヲ経テアチコチ痛発スル人アリ古ノ黴毒ノ療治ト云者ハ初メカ大事ノ者也初ヨリトクトト療治セザレハ病人ヨリウラミヲ受ルモノ也年月ヲ経タル湿毒ノ病人肌肉羸痩シタルニ萆薢四物湯十トヲ用テ滋

潤スレ圧毒気盛ナルニ因テ不肥モノハ雞肉湯ナドヲ用ユヘシ雞肉湯別ニ傳アリ湿毒ハ食養生房事ナドヲヨク／＼ツヽシム者ハ自愈スル者也何ホド服薬スル圧食養生悪シキ者ハ根ヲ切ヿナシ予家黴瘡秘録ノ十干丸ヲ用是ハ軽粉剤ヨリ少シヤワラカナルモノナレ圧畢竟軽粉剤ト同シ様ニナル者ゝ十干丸ノ内ニ礬石ヲ組タレ圧予家ニナシ右ヲ去リ用テ効ヲトルヿ多シ只今ニテセイ／＼乳ヲ用ル人金山ヨリ出ル蕈コワシト

云モノヲ礜石ノヿニ当テ用レ𪜈本中ニテ吟呆
スレハ一向不完モノゟ徽瘡秘録ニモセ礜石ナケ
レハ効ノナキヿヲ云ニ依テ書物ニナヅミヲス
ル人ハサイ初ノヿニテ惑(マトヒ)ヲ生メコヽロミズメ効
ナシト云ハ今日療治ヲセサル人ノ言フゟ凡テ
土茯苓軽粉ナドヲ多ク用テ湿毒ヲ去ルト云モ
ノハ俗ニスリコギヲ以テ重箱ナドヲ洗ト云タト
ヘノ如シ大抵ハ湿毒ハヌケル者ナレ𪜈凡テ湿
ト名(ナツ)ケタルハ軽粉ニテ内ノ津液ヲ乾シ土茯苓ヲ

用テ小便ヲ通シ乾カセハナヲルヿ故湿ト名ケタル。也湿ノ療治即効ノアルヿヲ好ミ家々ニハ速カニ治スルノ方アレドモ取アワスヿ也軽粉山皈来ナドニテ治スルト云モノハ凡テ内ヲヨワラスルニ依テ病ノ軽ルム者也湿毒ト云者ハ肉節ニツク者ユヘニカラダヲヤセサスルヿサエスレバ毒ノ軽キ者ハ十人ニ三四人ハ治スル者ナレドモ毒気ノ強キ者ハカラダヲヤセサスニ肉テイヨ〳〵ノボセ強クナルモノ也其時ハ草鮮ナドヲ用テヨロ

シ風テ乾カメ療治スルト云モノハタトヘハ苔イ
ケニイケテヲキテ苔ノイケタルヲ引上ル如キ
モノ之惣身ノ津液ヲ乾カス寸ハ苔ノモロキモ
強キモノニイタリテハ引上ヲキテモ其侭アリ
テ又氷ニ挾ムトキハモトノ通リニ栄ル者之ヤ
ムヿヲ得ズメ軽粉ナドヲ用ユル件ハ暑中或ハ
残暑ナドニ用ル𪜈ハ急ニ涎沫ニテ不食スルモ
ノ故ニ急ニ変発スルモメ之風テ人モ鳥ナドノ
油ノ、ル如ク寒気ニ向ヘハ毛孔トヾテ陽気ヲ不

脱故ニセイノ強キモノ丶左様ナル𪜈攻撃ヲ用
テモ左ホドニナラヌモノ丶凡テ骨痛〻ト云𪜈
方書ニモ骨痛トアレ𪜈骨ハイタムモノニアラ
ス筋ノイタム者也○楊梅瘡ニ茶碗ノ如キ大サ
ノ者アリ是ハグルリヲ湯ニテムス寸ハトレル
者也○結毒ト云者ハ湿ノ久ク成テ毒ノ停着メ
不動者ヲ云丶結毒ト成テ草蘚四物湯ヲダイニ
メ腰ナドノ痛ム者ニハ杜仲牛膝ナトヲ入丶草
蘚ト云者ハ凡テ小使ヲシブラス者ユヘ淋病ナ

ドアリル人ハサワルヿアリ左様ナル人ニハ草薢ヲ大合ニ一ハイキドニメ用ユルモヨシ外科正宗ノ結毒紫金丹外臺正宗ニテハ紫金丹土茯苓ヲ用テ湿毒ヲ去ルハ湿ヲ乾テゲスモノナリ草薢ハ潤ヲトルモノ也右ノ分チ混ズベカラズ近来廣筆記ノ結毒丸ヲ用テ効ヲトルヿアリ凡テ結毒トナレハ潤サ子ハトレヌモノ也又ヤセナドノナキ人ニハ赤散（金輪散ナリ）ナドヲ用モヨシ赤散ナドヲ用テイハ歩々土茯苓湯ニテモヨシ又

結毒非ズメ湿症ニテ咽喉腐爛スルヿアリ是ハ黴瘡秘録ニ出シ吹菜ヲ用テヨシ象牙ノ末咽喉ノ腐爛スルニ用テ効ヲトルヿアリ即吹菜ノ菜味ニアリタイデイ湿毒ノ療治ト云者ハ湿毒ガアレバ惣身少シ肥ルモノゝ肌始終ホメキ平生ニ風ヲ引キ安キ人ナレ风湿症ニナレバ风ヲ引ヿマレニナル者ゝ少ク肥タル人ニハ土茯苓ヲ用ユルモヨシ湿ドクヲ病メバ肥ルハヅナルニ常ヨリヤセルト云者ハ血燥スルヿ知ルベシ予

カ家ニテ四物草薢湯ヲ以テ湿毒ヲ療スル了
ハ他家ヨリ大ハ

癩風

惣体若キ時分ヨリキズヤミヲスルモノ瘀血ヨ
リスル者ハ臭気強ク皮膚ヲミルニムラ〳〵トメ
或ハ白クハ色合ガトカ〳〵トウラヌ者ハ足ナド
カ覚ヘナキヨウニシビレルナリ手モシビレル
モ足ヨリ先ニシビレルナリ足ナドノ色ニラケ
クルハ惣テ足ナドノナヘタガルモノヽ色ワル

ク肥ユル者ハ
養生臭類房事ヲ忌菜ハ防風通聖散ヲ用ユ

蟲

虫ト云テサイ初ヨリ虫斗ノ発スルヿハ少キモノヽヨコルヿモ少キモノヽ脾胃ノメグリタルウヽヨツテナスモノヽタマ〳〵ニハ虫斗ヨワヅラフ者アレ𪜈初ニハ停食ヲメ吐逆スルニヨツテ虫胃中ニサカノボリテ胸中ニアルトキハムカ〳〵トメ凡テ食臭ノ聞或ハ咽ヲ発スルモノヽ段々ト盛ナルトキハ菜食𪜈ニウケズ虫ニテ腹痛スルヿハ多クハ中脘ヨリ上ニメ痛ム者ヽタイ

テイ實症ニミユル人ハ海人草ヲ大合ニ五抔川楝子大一大黄大一甘中少右四味之此薬ニテトシ見レハ虫ヲトル者之胃口中ノ氣薄キ人ハ理中安蚘湯ナトヲ用ルモヨシ胃中冷テ虫ハウゴクヿアリ又熱ニテウゴクヿアリ冷ニ属スル者ハ木香丸ヲ用ユ熱ニ属スル者ハ大七丸ヲ用ユ萸菜ハ虫ノ条下ニテ見合セ考ヘ用ヘシ虫動ク時ハ煎湯ハ不受モノ也霍乱後ナド段々ツヨクテ胃汁ヲ吐キツクス時ハ胃中ニ逆氣アリテ飲食

氏ニ不受ヿアリ是ナドヲ虫ト心得テ療治ス
レハ害アル者ヘ益ナシ是ガヨク虫ノ症ニ以タレ氏
此症ニアラウワス○レハ害アル者ヘ○呉茱萸湯
ナドヲ煎メタイテイシヾニ貝ニ一ホドヅヽ口
中ニ入レテイツノ間ニヤラ咽エサガル様ニス
レハ呉茱萸湯ハ呉茱萸気逆ヲ治スル者ヘ効
アルユヘニ次第ニ治サマルモノヽ凡テエヅキ
ノアル病人ニ飯ナド食スヿ又イリ湯ナドヨロ
シカラズ強キエヅキノ病人ニハ子リ湯ヲコシ

ラエテヤキ塩ナド入テ菜ヲ四分湯ヲ六分程用ルモヨシ形ノアルモノヲ食スレハ胃中ノ逆ニ逆メ治マリカケタルモノモヲダツモノ〱エヅキノ病太ハ食事ヲヨク〱気ヲツクヘシエヅキト云モノハ病家サワキテ色々ト食物ヲ拵ヘテ用ユレドモ多ハ害ヲナスモノ〱甚サヘツヨ列テナレハエヅキニヨツテ格別ノヿモナキ者ニシカレ下利ヲカ子タルモノハ脉ナド絶スルモノハ是ハ変症ハカリガタキ者ニ小児ノ虫ト俗称ノ

アルモノアリ是ハ小児門ニテ説ヘシ療治ノ方
トシト遠タル者ヘ凡テ虫脉ト云者ハ小児ノ外脉
ハ弱テナドニテ脉ガ緊ニナラザル者之病勢ト
クラブレハ脉状ハカワラヌ者之寸中粉蜜湯粉
抔云者不知鉛粉ナドヘルヿアリ色々ノ説アレ乇
予ガ家千金方ニ隨テ粱米粉ヲ用千金方ニハ甘
艹粉蜜湯トハ不出粉ト云者ハカラヨリ諸症家
ノ説アレ乇不可慥○平人何ヿナキニ已ラゾウ
メンノ如キ者長サ一二尺モアルモノヲ下スヿ

アリ大便ノ時ニノヅミ肛門ヨリ段々長クナリ
テ糞壺(ツボ)マデモツヅクヿアリテ又弱リテ二足
ヅヽミテ切ルヿアリ是ヲ見ルニ運動セズ虫モ
出テナキモ云カタキ者之人ノ症ニヨリニ虫ノ
弱(ツヨ)キ者ハ不出尽ユヘニハサミナドニテ肛門ノ
キワニテ切ヲクモアリ是ヲ俗ニ時白ト云当否
ヲ不知コレハ別ニ療治ヲセスモヨキ者之其儘
ニヲクベシ一年ニ一度二度モ出ルモノ之出ル時ハ
脉ノ心持ハヨクナル者之凡テ虫ノアル症ニハ

下利ノアルハワルシ

犬咬

初ハ敗毒散ニ馬銭ナドヲ大合ニ二ハイ入レテ用ヘシ右ノ菜ヲ用ユレハ大ニ瞑眩メ卒倒スルヿヲ不知ヿアリ是ハ菜勢ノ然ラシムルニメ驚ヿナシ凡テ犬ニカマレタルト云者ハ御犬ニカキラス犬ノ尾ナドヲフンテカマレルヿアリ左様ナル人ハ赤小豆ヲ絶ヿ三年又マシナウナドモ赤小豆入ルユヘ不可食赤小豆ノ入タル菓子多キモノヘ是ナト心得ベシ赤小豆ニヨリテ毒ノ發シタル

ト云モノハカマレタル外サレ赤クナル者アリ
又ウミヅクロウモノアリ強ニイタリタルハ多
ク死スル〻後ニハ丈ノマ子ナドメ死スル〻

婦人

熱ナト出ルモノハ小柴胡湯ヲ用ルモヨシ香附
子婦人ノ聖剤ジヤセタル婦人ハ経水スクナキ
〻出ルヿノスクナキハ療治ムツカシキ〻不順
ナトヽ云ヲ余リ強キ薬ヲ以テ下ス者非ズ

産前并諸難治

凡テ婦人悪阻病ハ其人元虚羸ニメ血氣不足メ腎氣弱リ風冷ガ大過メ姙娠スル人之渇ノアル人ハ痰水心下ニ滞テ津液ノ化ス故ニ渇スル之不食スルハ痰水胃中隔ル故ニ凡テ不食メ胃氣弱キ故ニ寒熱モナキ之右ニ云ル外カ悪阻病ノ由之三四月ノ内ニ悪症ヲ発スルハ産前産後ニニ大テイニ食フベシカマワヌ也又小産スルニ五ケ月ヨリ十ケ月迄ノ内ニスル之イカヾナレバ

其症ハ腹中塊アツテ日数ノ立程胎カ大ニナル
故ニ其塊ト胎トスレ全テ下ルヽ随分ト悪血ヲ
消化スベシ古人ノ説ニ気血虚スル故ニ気血ヲ
補フ薬ヲ用テヨシト云ヰキカヌ者ヽ或ハ大黄
ヲ入レハ悪血下シ腹中ヲ化スルヤウニスレハ偏ク
ニナヲルヿモアレドモ不治ノヿアルモノヽ其外
凡テ方書ニ云ル如クハキカヌヽ別テ此小産ス
ル症ハドウモナラヌヽ

芎皈膠艾湯ハ条下ノ文ヲ見ル寸ハ胸胆ノ一症
斗ニ用ルニ見レ𪜈千金ニ婦人産後云々ト云ヲ
見ル𪜈ハ半産一切ノ血症ニ用テヨシ吐血下衂
血ニ用テ効ヲ得ルヿ多シ芎皈血ヲ補ヒ気ヲ調
膠艾地芍血ヲ化スル也當皈芍薬是ハ婦人懐娠
肢中疞痛ニテ疞ハ絞ト音通夫ニ随テ疞ハヒキ
シメルヤウニ痛ム也其因ヲ不言ワケナシニ卒
然ト乄痛也体気寒結ル症ニ用ユ当皈芍薬血
ヲ止乄痛ヲ主リ芎藭内ヲ湿乄痛ヲ止乄白朮

茯苓気ヲ温メ沢瀉水道ヲ利スルヿ几テ悪疽病
ニハ雀氏ノ半夏茯苓湯ヲ用テ大テイ治スル
ヿ夫レヲ用テ呕ニキカヌハ干姜人参半夏丸ヲ
用ルヿ人参干姜逆ヲ下シ内ヲ温メ半夏呕ヲ止
メ飲ヲ追フヿ凡テ妊娠小便ノ不通ニナルハ元
胎カ胞ヲオシワケルヤウニナル故ニ小便通シ
カタシ故ニ一身モ通イアシクメ重クナルヿ依
テ腫気ナドアルヿ先ヅ足ヨリ腫ノクルアレモ
不苦カマワズメヨシ此妊娠ノ腫ニ脚気アツテ

足シビレルノフラツクト云テ脚気アリ又ハ産後七夜或ハ二七夜中ニ行水ナドシテ湿ヲ受テ脚気ニナルヿ凡テ産後ノ腫気ハカマワヌモノヿ然レドモ七ヤノ内ニモ腫気アツテ気キウアルハヲウヰニギヤクジヤウシテ死スル有謹シムベシ其症ハ脚気ノ如ク衝逆スルヿ死症ノモノハ兇角ニ気急アルナリ又ハ産前ヨリ気急アツテ咽喘メ逆上ノキミアルハ恐ルヘシ脚血カワギテ上ルヿ産後七夜ノ中ニ吐血ナドメ死ス

ルモ、ノヽ凡テ妊娠ハ疾病ニハ非ス不薬メヨレ
然レ𪜈薬ヲ用子ハナラヌ事ハ當帰散ヲ用テヨ
シ大テイノヿハステヨイテヨシ當帰散方解芎
薬血脉ヲ通シ稽ス川芎血一切ヲ通ス白朮脾臍臍
ノ血ヲ通ス黄芩白朮ハ安胎ト云丹溪ナトモ云
又ハアシキト云人モ有皆非ヽ凡テ妊娠何レ相
合見テ功ヲナスヽ温経湯呉茱萸当皈温内芎
藭治血閉通血脉牡丹皮除悪血主支人シ通血阿
膠治下血半夏本草ヲ考ルニ此主治ニ合フナ

シ如何ナルヿヤ未詳此症ハ血氣𪜈ニ虚ス或ハ瘀血ヲ追フヿモセス凡テ婦人房中一切下血不止月水不調並生之也凡テ一切瘀血ノ有ニモ無ニモ不抱又瘀血後血虚并月水不調ルヲ多用古今婦人門ニ此方ヲ載サルハナシ至テ妙剤也此方ハ長ク服メ内ヲ調フ也膠艾湯ハ下血ヲ目的ニメ直ニ血ヲ止ル此方ハ不然月水不須帯下ニ用テ長ク功ヲ得ベシ

婦人月経遅速悪血之療

肥人ハ経水少ハ血海ニテ出口ヲシメテ不出全体血有余テ身体ニ廻テ肥ス又瘦人経水多下ハ身ノメクリヨキ故ニ多下リテ瘦ルヽ男子ハ精血ヲ皮毛ニ灑ク故ニ毛多シ婦人ノハ衝脉ニ貯テ経水トナル故ニ毛ナシ凡テ婦人ノ候ハ経水調不調ヲ問第一問法之経水不調メ或ハ多下リ或ハ時節ニ不来或ハ小腹冷気ニテ悪血アルニ金匱ノ温経湯ヲ用ヒ甚妙剤也又経水アツテ後

腹痛アルハ血虚ニ四物湯又ハ臨時テ建中湯モ
用ル凡テ経水前ノ腹痛ハ悪血ナリ無尽蔵ノ滑石
散ヲ用ユ又ハ辰砂散ノ間ニモ用辰砂散ハリク
くト上気ヲ悪血凡テ産後ナトノ悪血ニ用甚効
アリテ虚実ノ症ヲ不分用テ何湯ニ兼用ニモ佳
ヽ又経水アル内或其後一二日ノ内ニ腹痛スルハ
気テレメテ痛ムヽ此症ハトカク気滞ル故ニ香
附子烏薬ノイタケ症ニメ医通四烏湯ヲ用又気ガ
結シ経水不順ニメブタく肥テ悪血アツテ虚症

ノ人ハ逍遥散ヲ用此実症ハ入門正気天香湯ヲ用ユ婦人腹痛ハ凡テ悪血ノアル処カ痛ム也又経水前ニ頭痛スルハ飲也医通ニ用ユル圭枝橘皮干姜ノ類ヲ用ユ

痘瘡 附 疳 漫驚風 馬脾風

最初ニ初熱ノ外ハ分リニクキ者ニテ熱ノ盛ナルハ後世家ニテハ升广葛根湯ヲ用エ吾ガ家ニテハ先初ニ達原飲用エサテアキ地ナク十分ニ出ズルヲ是ヲ十分ニト云出モノヽアイダ〳〵ノ細キ筋通リツブノ一ツ〳〵分レヲル者ハ何ホト多ク出ルモ格別ノヿモナキヽ痘ト云者ハトカク痒ノ出ル者ヽカヽシテ皮ヤブルヽ寸ハ毒散在メ難症ヲ発スルモノヽ古人モ云通リツホミヨリ

苔咲実ノルニイタリテソレマテトカク大風大雨ニ不過メ後スルモノ之発斑メ二日目位ヨリチラ〱見エカケテコマカク斑ツヨキ者ハヨク〱病家ヘアイタイスベシ左様ノ症ハ八日九日十日ノ間ニ変症出ル者之ソコノ処ヲガテンユカズト云置ベシ出モノヽコマカクテカヨシ灰白色ニナリタル者ハ補中益気湯ナドヲ用ル之初ノ斑ノ間ニ乙キツケルモノハ不苦八日九日ニ成テ寒戦咬牙ヲスルモノハ多ク変症之是

等其症ニ随分療治スヘシ風寒ニヨツテフレテ発スルモノハ外来ノ病因アレハ不足恐モノ乀○賊痘ト云テ三ツ四ツ一処ニシタル位ニ水ブクレニ大キニナルアリ是ハ針ヲ以テツブスベシ初熱壮ニメ大便秘結スルモノハ大黄ヲ以テ下スヿモヨシタイテイ痘出テ達原飲ヲ用ベシ痘ト分リタルすハ平頃清解飲ヲ用ユベシ痘咽ニ出咽腫痛声唖スルモノニハ利咽解毒歯三枚ニツヾキテ又ケルヿアリ是急症乀走馬疳トテ

本走馬疳ニテハナケレ𪜈走馬疳ノ療治スベシ
小児四五才ニイタルマテ脉状ノ分リニクキモ
ノヿ故ニ古人モ虎口三関ノ脉外ニミル法アレ
𪜈多サルヿ癸シナカラ分ラヌト云テウチヲク
ヿニ非ス小児診法メ一助𪜈ナルベキモノ故ナ
リ

小児目ニコワキ者ヲ見或ハモノ音ナトニ驚キ
テフトビクツキ出其後発熱シ夜多ナドイ子カ
子テ寐ザメニビクビクスルモノ有乳哺ノ小児ナ

ドハ其ヨク吐乳ヲナスアリ是ハ日ニ経テ吐乳不知すハ驚風ヲ発ス今日驚ハ急驚風ト云テ大使ナドカタキ着ハ紫円ナドヲ用テ下スヘ三戈ノ小児ハ小豆斗用様ハ千金方紫円ノ余下ニ委クアレ𪜈一分ホド、思ウバ七厘斗リニヒカエ目ニ用ルモヨシ煎菜ハ千金ノ竜胆湯ヲ可用吐乳ナドスル小児ノヒキツケモナキ者ニハ銭氏白朮散ナド用テヨシシカシナカラ吐乳ノ小児煎菜ヲ用ルヿヲセズ乳汁菜汁トノウメアイア

シキモノヽ先ツ三度ノ吐乳ハカマワ子ドモ是ハ
クセヅクヿ見バ先乳ヲホスベシ菜汁モ不用○
空腹ニナルモノヲ其侭ニユブリ子サシ〱シテ
ノミタガル乳ヲ一口ニ口呑セテタトヘテ言ハ
胃中ノ陽気ニ乳汁ノイリツキテ俗ニ云ヤケ石
ニ水ト云タトヘアリ右ノ通ニスレハ初ノ内ニト
マル者ヽ吐乳スレハトテモ是ヲイ〱菜ヲ用ソノ上
乳汁ヲ無理ニ進ムル胃中ニ逆気アル故ニイヨ〱
吐ス吐ニ因テ胃中ノ陽気傷損ニヘ難症ト云ハ

漫驚風ナトニナリテ難治ノ症トナルヿ疳ト云
者ハ討味ナルモノヲ食シ胃中ニモタレテ発ス
ルヿ消痞飲ヨクキク者ヿ消痞飲ノニガキヲキ
ラウ者ニハ丸薬ニメ用ユベシ往来寒熱スル者
浄府湯ヲ用ルハ食ニ味増ナトヲ食スル小児ニ
用乳汁斗ノ小児ナドニハ用ニクキヿ浄府湯ト
云名ハ胃ノ府ヲスヾシクスルヿト云ヨリ出タル
ヿ○小児咳嗽上気ニハ小品射干湯ヨクキク者
ヿ小児ノ咳モ出生百日ノ内ナラバ是ヲ百醉嗽

ト云テ難治ノ症シ後痟症ヲ発メ死ス百日後ナラバ格別ノヿモナキヽナゼニ百晬嗽ハ不知ナラハ肺ハ嗽蔵ナレド出生後間モナキ故藏府カタマラザルヿハ百日ノ内ニ咳出バ後ニ血ヲ吐者シ小児ニモセキモ少シアリテ大人ノ喘息ノ如ク咽喉疼涎アリテ乳汁菜食モニ通リカ子ルモノハ是ヲ馬脾風ト云不治者シソノ状大人ノ喘息ニ同シ最初ノ病因ハ爪ヲ引タル如クシ次第〳〵ニ勢ツクナルモノシ準縄ナドニ累エ心黄ナドノ

菜アレ圧キヽニクキ者之実症・小児ナドハ凌キ
ヲヽセル者タマサカニ有者之

痰飲

痰飲ハ古ノ論ト後世之論ト丹溪以来言処ト異
之古論ハ金匱ニ云ル腸間瀝々有声ト云之後世
ノハ飲カ契ニヨリテ凝剥結テ子ハリタルヲ
云之四飲ノ論金匱ニ詳之痰飲ニテ桂苓朮甘湯
ヲ用ハ飲カ心下ニ有テ胸脇ノ古ハサヽヘ満時
ハ清陽カ上頭ヘ上ラス故ニ目眩症アリ扱ハ腎

気丸ト同ク用テ此方ヲ通ス其中ニテ胃気ヲ和
シ相合メ小使ヲ利スルニナツテ水飲ヲ去ルヿ
○腎気丸ノ主治飲カ少シアレハ短気ナリ然ラ
ハ支飲モ留飲モシナく短気ニメ凡テ水カ心下ニ
トヽマル故ニ小使ヨリ去ヨシ全体腎気丸ハ方意
不解𪜈腎気ノ不足ヲ治ス故ニ　利スルヿ也
黄カ主ニメ沢瀉茯苓主支ニテ水飲ヲ利ストモ云
ヘ𪜈不詳山茱萸ハ神茱ニ用ヿ古人ノ方ヲ製ス
ル奇妙ヿ此方多ク轉胞或虚労腰痛又ハ脚気

又ハ水腫虚症ニテ小便ノ不通ニ用虚腫ナドハヨ
ク効アリ発レ圧実腫ハ不治ヽ又ハ後世脾胃浮
凢テ腹ノ下リニ用レ圧無効

支飲

支飲ノ症古人説アレモ穏ナラス中華ニテ支飲ノ症ハ未詳大カタハ腎気ノトツザジヤノ心蔵ノ痞塞スルハ或脾胃ノ不足ナト云テ支飲ノ称候侖モ不詳レトモ此証ハ金匱ノ木防已湯聖済旋覆花湯ノ証多シ木防已湯ノ主治ニテハ平人全体胸中ニヨコニ薄絹ヲ隔タル如キモノカ心肺ノ下ニアリ此ヲ膈幕ト云テ有此処ヘ飲カ支テ其間ヘ集ス然ルトキハ上胸膈ニテハ肺気不利ヲナシテ咽カセ

リツキ煩満ヲナシ下肢ニテハ冒気カ逆ヲナシ
テ心下カ堅ク成テ塞シ又ハ黧黒トアレモ黧
黒ノコトハナキコト右ノ如キカ支飲ノ候之又聖済
旋覆苓湯ノ症ハ胸膈実症ニテ胸ヘサヽヘルコト
強クメ心下ノツカヘカタクナルコトハ先ナシレ
此症ハ旋覆苓湯ヨリ外方ナシ前ニ云ル如キ等ニ
全体方少シ又病原候論ノ説モ廣メ又宜此ハ飲
カ胸膈ノ中ニ停積メ心ニ支乗スト云リ亦佳シ
又ハ飲カ肺ノ支絡ニ支ルト云説モアリ甚多説

ナレ𪜈右ノ論ノ説之此症ハ脉弦緊沉緊ニナル之
咽ノ喘息𪜈ニマゴウナレ𪜈全体ノ別アリ喘ハ
見症ニ〆未症之其上咽ヘツマル如クナル時ニ
喘息ヨリ喘ハ見〇弱シ又支飲ノ最初発スル𪜈
ノニ胸中ノ発スルアリ又ハ手足厥冷ニ〆夫ヨ
リ胃気逆〆気急〆発スルアリ其外諸発種々有
ヤウスニヨリテ見量スヘシ又腫気有テイキタ
ワシニ有同シヤウナレ𪜈本別之支飲ノイキタ
ワシニアツテカライキタワシクナル之右ヲ前

後ノ別アルヿ又腫気ル症ニ初ノ少シハ足ナド
ニ少シムリミアルモノアリ此以上ハ症ヲ論スル
ヿ一木防已湯ヲ用ルハ横寐ナラズメイキタリ
シクシテ心下ニ堅マリフサカツテ飲ノサヽユ
ルヿ又高枕ヲメフシ咽カ喘メ食モ常ノ如ク始
終ヨク食スルニ用旋覆花湯ト互ニ用ヲ前後
スルモアリ夫ハ旋覆花湯ノ下ニ弁ス先ツ一切初
発ヨリ心下ノカタキハ木防已湯ヲ用テ水ヲ利
シ気ヲ下ス然ル𪜈木防已湯ヲ用テ心下ノ否

塞ノカタキハ下ス痞ノアルハ次ノ木防已加茯苓芒硝湯ヲ用ヘシ旋覆苓湯下症ナキハ大黄ヲ去テ用レ𪜈下シタキ寸ハ用レ𪜈此ハ又右ノ下症トハ遠テ心下ノカタマリナキニ下シタキニ用又ハ小菜気丸ニテ下スモ有又腫気ガ強キニハ塩ダチスレハ抜ルヽ又支飲ノ中ニテモ懸飲ノ方ニ近メ勢強ノ痛アルホニハマヽハ控延丹ニテ下スモアリ然レ𪜈余リ不用ヽ木防已ニテ腫気ノ強ニハ甘遂一条ヲ用ルヿモアリ又甘遂

半夏湯主治ニハ留飲ト斗リアレ圧凡テ留飲
脚気支飲ナトノ気急アツテムカツキ有ハ用レ
圧発ク亊亦妙ゝ此服用ハ甘遂一分ヲ用テ又タ
ニ一匕益ヘシ甘遂ヲ含汁ニメ余ノ三呆ヲ飲ベシ
控涎丹モ此方ノヌルキ者ナレ圧トクト見定カ
弟一ゝ○聖済ノ旋覆花湯ハ木防已湯ニ似タ
レ圧先弟一心下ノ堅キニ用ゝ甚奇剤ニメ一具
治スルゝ右ニ云ル如ク一通リハ大黄ヲ去テ用
ルゝ此ハ咽カ渇ノ喘ツキアツテ気急亦有テ

横寀モナラズメ胃腸ノアタリニ塞ルヿ木防已湯ノ症ヨリツヨキヿ此方ヲ用テ一旦同シテ又発スル寸ハタトヘ心下ノ塊ナク木防已湯ヲ用但シ又養生ガ第一ニ味噌汁丸テ油ゴキモノガ禁物ニ〇支飲ニテ吐血アルハ少シユルクナルニ大分ヨロシ瘀血ヲ吐シテシマウト云然尤否ヨシラズ〇一旦治メ又発シ再應発シタルアリ又二三年モカヽル人アリ久シキニハ控涎丹ハ用ラレヌニ先実症ナレバ塩梅ヨク用レハ

治効ヲウルヿアリ○旋覆花湯ノ葉白ハ飲ヲ遂イ咳ヲ療ス旋覆花ハ飲ヲ逐ヒ気逆ヲ下ス〆

黄疸

此病ハ一身ノ黄金色ニナル病ニテ其症種々アリ其内余症少シモナクメ唯一身黄ナル一症ノ時疫傷寒ニテモ余病中ニ黄色発スレハ黄疸トハ不言各其本症ニ随テ療治スベシ其内時疫十ドノハ別メ考ベシ他病中黄発スル事大分ニアルヽ不可失正治セ黄疸病ノ名種々アリ然レ𪜈酒疸女労疸ハ不治ノ候ヽ穀疸ハ末見様ハキヨ仕タル如ク黒クナルヽ面ニ皺カヨルヽ熱ニモ

アラズメ久シクスレバ成者也足下ノ熱スルハ女労疸也小使不通メ腹ノ一ハイニ成ルハ穀疸也又心中モ熱足下モ熱シ小使モ不利ナルハ酒疸也右三ツ分チ難シ茵蔯湯此主治ハ穀疸也然レ𪜈寒熱ヲ成シ不食メ食スレハ頭眩症アルハ熱厥メ胸モムシヤ〱シタルハ此疸也然ルハ此方ニテ利下ヲメ大使小使ヨリ随テ治スベシ茵蔯ハ主ニメ黄ヲ去リ小使ヲ利ス梔子佐トメ大小腸ヲ利シ大黄腸胃ヲ蕩滌シ瘀血ヲサルナリ凡テ

茵蔯ハ一切ノ黄疸ニ用ユ兎角湿熱鬱蒸シタルハ用初メ熱アル症ハ其内早々ニ熱発ス多ハ諸症ノ中ニテ熱強キハ時疫ノ中ニ此方ヲ以テ下スベシ

○消礬散 金匱 此ハ不用此主治ノ症ハ有物多クハ十シ常ナ黄疸ハ初ハ熱アレ𪜈後ニハ熱ナシ女労疸ハ日晡ニ熱アルヿ腹満如水状ハ腎気メクラヌヿ満ヲ兼ヌルハ脾胃ヵ傷ルナリ消石ハ熱ヲ除ク礬ハ内ニ滞ル熱ヲ除ク大麦汁ハ腎ヲ傷ルト

云ヿアレドモ不発乀胃ノ府ヲ健ニシ小使ヲ能通
スル乀凡テ茵蔯五苓散ヲ用ルハ最初寒気有テ
熱モ有巽日ニ至頭痛メ熱ナクメ脈遅ニ成テコ
トノ外キムツカシク成テヨギヲガブツテヅヽ
ナガル乀発ルトキハ小使カ常ノ如キトハ少シ
遠テ醤油ノ如クナル寸此方ヲ用ヒ右ノ処ニテ
世上ノ医神菜ヲ用テ虚労ナドヽ云ハ非乀今ア
ルハ多ハ此病乀茵蔯ニテ湿熱ヲ解故黄疸病ニ
用乀五苓散ニハ小使利スレハ湿熱カ化和スル乀

此症ハ金匱ノ頭昏ニ有ル通也甚以テムツカシキモノ也又凡テ小便変スルハ定跡也或ハ自利スルモノ不利スルモノ有皆虚症之変証モ有也然レモ右ノ法ノ如ク先大凡也諸病中ニ黄ヲ発スル此方ハ不用ニ随フ也其傷寒湿疫トカ其内ニテ黄ヲ発スルハ別也大事也此茵蔯五苓散ヲ用ルハ不然メ聖済ノ通ニ茵蔯五苓散凡テ此方ハ阳黄用初一日ハ凡ヲ引タル如ニメ沉数ニメ沉二日ヨリ数正テ病人気ヲモクナル也不食メ或ハ脉

十ドモ後脉ノ如クナツテ主支湯ノ如ナル乀脉ニテ分ツベシ奇妙乀小使子バル者乀茵蔯五苓ヲ用テ嘔アル者小半夏加茯苓ヲ用テ黄カ発スレハ嘔モ蔚ノ間ニ从フテヤムモノ乀○猪羔煎ハマンテンカノ油ニテ頭髪ヲ煎メ服ス凡テ酒又ハ色々ノ者ヲシテ煎服スルハ日本人ハイカニモ不得服乀然氏見斗臨時可計療乀○黄疸悪心症ハ渇アツテ嘔テ有服膇ルハアレキ乀心得ヘシ其夜不臥メ煩燥強クメ熱ツヨキハ三四日ニメ

死○癖疸トハ凡テ豚ニ塊アッテ身体モ黄ニナ
ルハ皆癖疸之

水氣病

此篇題ハ気ノ字在後世ハ水斗ヲ水腫ト云ヘ圧此処ニ於テ見レハ水腫ヲ混メ水気ト云ヿナリ即金匱ノ始ニ風皮正石黄汗ノ五名ヲ分ツ此五ツニ随分ワカルヽ心然レ圧唐以下ハ五水ト水ノ説ハアレ圧此外ノ五水ノ外ハ分レカタシ今暫此ニ弁スハ五水之○風水ト皮水ト相類メ浮ニ属ス正水ト石水ト相類メ裏ニ属ス之風水ノ一正ハ元風ヲ得テ脉モ多ハ浮之ヤスク疼痛悪風スル

乀○皮水ノ一症ハ水気皮膚ニ容スル故ニヤハリ脉浮ニメ外症ノ腫アッテ悪風モナク腹カ大鼓ノ如クメ渇セズ正水脉（ミャク）沉遅乀正ハ正ニメ経病ヲ受ト云コ乀○石水ハ外皮膚ニ散ス上心肺ニ上ラス水散セスメ水石ノ如ク堅キ乀○黄汗ノ正水ト相似タリト云ヘ氏只汗出黄栢汁ニテ夜

着

ヲ染タル如クナル乀右ノ五水ハ各別アリ凡テ腫気ハ先ツ右ノ五ツヲワカチ其上ヘ病乀虚症ト実証ト腫気ノ表裏虚実寒熱トヲ別ヘシ

弟一先按腹メ手足モ見ザルウチニ足ニ腫アルヿ
ヲ知ベシ按テ陥ル外ヲ以テ腫気ト知ハ下エノ虚
痞其内ニ実腫ハヨシテオチイラスメ外臺ニ曰
肌肉起張スル故ナリ虚腫ハ陥ルナリ此ニテハカツヘ
シ又裏水ト云アリ此モ今アルナリ正水ノ色ノ黄ハ
ナドヲ兼ヌルナリ此症ハ越婢加朮湯ニテ陽ヲ廻
シ水ヲ化ス多ハ其内ニ風水裏水皮水有テ皆越
婢加朮湯ヲ用ヘシ凡テ腫気ニ汗ヲ発スルハ栄
衛ヲ和メ水気ヲ利メ小使ヨリ通ス古ハ発汗ス

後世ハ小便サヘ通スレハ能ト心得シ氏遠イシ又
腫ノ表ニ有ハ一身腫テ脉ニハナシ服一面ニ腫
アッテ気急ナリ心下堅リ脉浮ナルハ発汗スベシ
脚気ニテモ皆广黄ニテ発汗シ檳榔ナトニテ気
ヲ遠ニ通ス凡テ腫気発汗スレハ小便ヲ利スルヿ
ナリテモヨロシ兼テ可服膺○防已黄芪湯此ハ凡
水ニテ脉浮ニメ身重シ此ハ風ト水トカ肌腠ヲ
侵ス凡ハ肌腠ノ阳気ト相合メ蒸ス故ニ汗出悪
風ノ症アルヽ防已逐風利水黄芪佐防已帝ノト

ハ異ニタトヘハ詳徹宗カ防已防風ト相用テ発
汗シタルト同シ防已黄芪ハ常例ト異ニ白朮ニ
テ乾スルニ甘草大棗ハ桂支湯ノ例ニヨルヘシ○
越婢湯此外ハ風水ニメ風多ク気強クメ一身処
トメ腫サルハナキニ身汗出シトく出テ俄ニ不
出ニ广黄ニテ汗ヲ発シ石羔ニテ广黄ヲ助ルニ
姜棗依桂支湯ノ例○悪風スルニハ加附子コレハ
桂支加附子湯ト同意○風水加朮四両云々是未詳
ㇳモ汗出ニハ白朮ヲ入ルカヨシ故ニ此方ニテモ

用ユ一切腫気ノ表症ニメ脉ノ浮カ目的ニメ皆
用脚気ナトニモ表症アルニ用ユ○防已茯苓湯
皮毛カ風ヲウクルト腫ルヽ此方ハ上ノ防已黄
芪ノ内白朮ヲ去ルハ自汗ナキヽ姜棗ヲ去ハ効
ヲ専ニスルヽ主支茯苓ハ陽ヲ廻シ水ヲ遂ナリ
○甘中广黄湯ハ广黄ニテ陽気ヲ発シ甘中ニテ
気ヲメクラスヽ阳メクレハ気モ又自化スルヽ
此方ヲ元ニメ越婢湯ヲ但タテタルヽ○夫壅散
ニテ下スルハ実症ヽ虚症ニテ下スハ悪シ不可

用之先実脾飲ハ八味丸トヲ用ヌハ壮原湯ノ類
ヲ用ユ○安豆湯此ハ一通ノ腫気ニ凡テ用テヨ
クキク之安豆ヲ炒テ大分可用之浪苍旋寒ノ水
ミテ晒シ乾（乾）シ用ユト云不知本中ヲ桜スルニ赤
小豆ヨク安小豆ト云テ黒ミアルヲ用ユヘシ又
商陸湯モ用ユレ氏難服用随分可用之○水蠱
此症ハス丶ハキ之タル如ク黒クナル腹中雷鳴
メ皮膚カ黒クナルカ目的之先年モ一人アリ大
カタ死スル之○腫気ニ下シタルガ下スハ悪之

不得止ハ小便ヨリヌクヘシ下ストアトカ悪ク
ナルヽ先安豆湯ノ類ニテ小便ヘヌクカ可ヽ腫
気痢病ニ不食ハ不治ノモノヽ虚スルモアレ、
凡テ塩気ハ悪シ為飲糧九十ト用ルモ其内ニ酴
斗リカ危メ有ヽ酢モ忌氏ヤウ〡ナケレハ可許
○表ノ腫気ハ風水ノ内ニ入表症ナケレハ越脾
加朮湯ニテ汗スルカ佳ヽ悪寒アラハ附子ヲ加
ル汗ヲ出テ風ニアタルハ風水ヽ○今世上ニテ
足ニ腫アルト上ヘノホセルトノ症アレハ脚気

ト云不焚之脚気ハ痛カダルキカレビレルカ引
ハルカスル也右ノ症ナク脚ノハレアルハ不脚
気之旨有人忽脚跗腫漸上至膝云々已ニテ可知
○千金翼澤瀉湯鯉ヲ用ルニハ八拾目アル者ヲ
水一外入六合煎其汁ニテ菜ニ服分アル也扱鯉
ヲ拭ニ生タル者故ニハ子ル之濡紙以テ頭ヲ包
ミ拭ルヘレ右臭ノ煮汁ニテ赤小豆ニ升可中ニ
両麦門冬二両人夕ニ両茯苓三両右ノ料如ク二
合用ル水ノ法ハ古今録驗ノ料之世上ニ用ル鯉

臭ト昆布トノ〇気水ハイキダワシキカ先ニテ
跡ニテ水ノノクルトミユルヽ外臺王壽モ余リ療
治セス人故薬方ヲヒタモノ引有〇腫気ニ服下
ルハ悪症之腫気カ先ヘ有テ後ニ木防已甘中主
心茯苓黄芪白朮生姜為薬ノ方ヲ可用服下リア
トデハレ有ハ労症ナトニ有夫ハ大事ナイ丁ノ
脚気ナドノモヽ初ヨリ服ノ下ルハ心衝心スルノ
△苦瓠ハセンナリ胡壺ノ千イサキウツクシキ
モノヽ奇効有大豆ホドニ丸メ温鈍ホドニ丸

メ温ノ粉ヲ衣ニメヲキモ粒ツヽ用レ虚弱ノ
人ハ其侭服下ルモノヽ

以上楓亭先生説

風湿

風湿ハ後ニナリテハ痛風ト云唐ニテ俗名ナレ氏後世ニ至テハ此名ヲ呼フ多シ初起ハ時疫ナトノ如ク熱ノ盛ニ出ル者アリ又次第ニ惣身ノツカイメ〳〵ノ痛ムモアリ何レ氏少シツヽ悪寒ノアル者ハ寒ケノアルハ何レモ麻杏意甘湯ヲ用テ汗ヲ発スヘシロクモノ汗ヲ発ルナハ次第ニ痛カルタナルモノ〳〵大抵痛ミナトノ内六七ヲ去ナハ海藻独活湯ヲ用ヘシ便秘スル者ニハ大黄

ヲヘテヨシ虚症ノ人ニ見ハキビシク汗ヲ発ス
ヘカラス当皈粘痛湯或甘中附子湯ナトヲ用ル
モヨシ重キ痛ナレハ初発熱ノ氏ニハ譫語ヲ発
シ舌胎乾燥スルモノモアリ又熱強キ氏時疫ナ
ドニヨク似テワカチカタキ氏ハ達原飲ヲ用テ
二三日見合スヘシ大テイシレルヽ先ハ凡温ハ
熱強キ内ニ節〱ノ痛アチコチトメクル其至
テ痛ノ強キ処ヲ見ルニ少シツヽ腫ルモノヽソ
コラナトヲ目的トスヘシ時疫ノ骨節疼痛ハ

○風濕ハ膝（ヒザ）ナドヘ多リ腫出ルモノニシテ発汗△＊
腫ナレ△多ラサル寸ハ久メ寉膝風トナル是ハ難治
ノ証ハ膝ナド片足ニ比スレハ格別ニ大ニメ其
腫強ク已カリアルモノハ癰（ヨウ）匿腫ル処ニ針ナト
シテ血ヲトルモノアリ何程血ヲ取テモ治スル
ヿナシ寉膝風トナラント欲スル寸萆薢四物湯
ニ杜中ナトヲ入用ルモノハ次第ニ腫レ消シ自
然ト愈ヘ寉膝風モ三四年ニナリテ治シカ子タ
ルモノハ療治スルトテモヨクヽ病家ヘ相對メ
置ヘシ中々急ニハ治セザルモノハ先半季斗モ

菜ヲ用見ヨト云テ療治ニカヽルベシ外ニテハ痛爪ヲチンバニスルヿアリ余カ家弁マテ何程ノ痛風ノ人ト云ヿヲシラサレ氏是迄チンバニナリタルヿハナシ是ハ初発汗タラサル故右ノ病滞積メ如此チンハナドニナルヽ一辺痛タル処ハ痛ナク氏シヒレルヿアル又暫クスレハ右ノ処痛ナリ一度痛テ二度ハ痛サルト云ヿハナキヿニテ毒ノ重キモノハ元ノ処ヲ三度モメグルヽ霍膝風ニ杜仲末一呆酒ニテ用ルヿナリヨクキクモノヽ

凡テ膝ノ節ニテ痛ムモノハ扗伸ホヨクリキク之膝大ニナリテ前後ノホソキモノ之〇歴節風ハ止時アリ痛風ハ昼夜ノ分チナク寒熱往來アリ夜分斗リ痛ミ錐ニテ刺カ如クナルハ白虎風ト云

狂

狂ト云モノハ罵詈シテ親踈ヲ避ケズ多ク怒ヲ含ナトスル故怒狂ナト、ツヽクヽ元狂ヲ発スル人ハ気ノヨワキ人多キモノニメ其内荒キ者ハ易治薬ハ大抵本事方ノ茯神ニ驚気円ヲ兼用ス多リハ発狂スル人夜分寐カ子ルモノヽ寧志膏ナドヲ用ル時ハヨク子ムリ出ルモノヘ怒狂甚時ハ十日ニテモ廿日ニテモ不寐者フト子ムリツク時一昼夜程モ子サシテ其間薬食共ニヨコタ

ルドモサモ不苦ヿニテ寐サスヲヨシト云アレク
タヒレテ能ク寐タルアトハウツトリトメ気ヌ
ケノシタル人ノ如シ右ノ処ナドヘ菜ヲ与フベシ
古人モ発狂ノ症ナキドニハ食ヲ奪フヿ有故ニ
食進ムドモ大テイニカヘメニスヘシ又大抵持マ
ヘノ皮膚壮盛ナル人ハ瀧ニウタシテヨシ度々
ウタメ冷スすハ逆上下リテヨク寐ルモノ之右
云通リ眠出タラハイツ迄モ寐サスヘシ呼ヲコ
スヿナカレ又気遠ヒヲクヽルニハ細引ナドデ

直ニクヽル𪜈ハ手ニクヒ入テ痛処出来テイエカヌ
ルモノハ又人ナド付テ井戸ナドノアヤウキ外ル
用心サスヘシ大便ナト秘結スル𪜈ハ大業気ナ
ドニ養生丹兼用スルモヨシ大抵薬カニテ十
日廿日ノ内ニ次第〳〵病勢ユルマル者ハヨシ
益壮ニナルモノハ瀧ニウタスモヨシ発狂ハ脾
労ノ症ナトニマヽアル者ハ脾労ノ内ナドニ発
スル寸五六日ノ内ニ治ル者ハヨシ不治寸ハ久
シクイエカヌルモノハ狂ハ強クアルヽモノ程

治リノ早キモノハ若キ女ナト色気遠ナト云テ
人ヲ見テ突イナドスル者アリ是ハ陽ニ属スル
症ニテハナシハタヨリオタツレバ必ハ荒クナ
レ𪜈大タヽイハシヅカニメ或ハ着物ノ縫目ナ
ドヲホドキ或ハ衣服ナドモ何程垢ズケ𪜈其侭
ニテ着カヘズ只手先キナドムセウニ何辺モ洗
ナドスルハ是ナドモ早ク治セ(マル)凡(モノ)ハヨシ治マラ
サル寸ハ多ク痼疾トナルモノハ是ハ後ニ失心
風トナルハ失心風ハ即癲ハ失心凡ナドニナ

ラントスル前ニ絜瘲ト云テキレイベキスル
アリ是ナドハ早ク茯神散ヲ用ヘシ凡テ発狂
ノ症ニハ茯神散ニ驚気円ナド用テヨシ医者
ノヿ故療治セスト云テハ済スヿ故先右ホノ薬
ヲ用ユヘシ然シナカラ此時ハ薬ハキカヌモノ
故暫クノ内ニテ餘人ヘユヅルヘシイユウ虚症
ニ属メ不寐者ハ深師酸棗仁湯ナト用テヨシ
此方ニテ茯神散ヲ用ル外ヘ後世医者ハ苓茯補
心湯ナドヲ用ユ格別効ナシ

頭痛

頭痛ハ種々アリ傷寒傷風ナドニ有トキハ別ニ頭痛ノ療治セズドモ本療ノ薬ヲ用ルトキハ自然ト治スルモノ也婦人ナド血熱ニヨツテ頭痛ノスルモノアリ是ハ辰砂散ニ小柴胡ナドヲ用ルトキハ能愈ル也男女ドモ脾胃ノ痞ニハ俗ニ云米カミノ外ニテ痛ム也是モ別ノ治療ニ不及本薬ニテ治スヘシ徽瘡○○○属セズ気逆強クメ強ク頭痛スルモノアリ脉ナド浮強ニメ別ニ熱ナク皮膚肌

勝常ノ如クナリ言語飲食常ニカワラス大頭痛
ニテ発作有時強キ時ハ頭ノ内ドウイト鳴ル様
ニ覚ヘテ目ノ明ニクキモノアリ昼夜毛頭ヲカ
ヽエテ居ル者酒製ノ防風通聖散ナドヲ与フ
レバ大体一廻リ程ニテ頭痛過半減スルヘ十四
日ニメ大カタイユルモノアリ大ニ下利スル者
ニハ不可与微利スル者ニハヨシテ用ベシ十分
ニ頭痛ヤム迄用タル寸ハ大ニ下利強クメ病勢
壮ナル時ハ下リスクナクユルムニ随テ下利強

シ跡ハ釣藤散ナトヲ用テモヨシ余カ家頭風神方ナドヲ用テ効ヲ得ルヿ多ケレドモ通聖散ノ速ナルニ不及然レドモ通聖散ヲ用ル人ハ大テイ胃ノ府盛ニメ攻撃ヲ用テモヨケレドモ虚証ノ人ナドニハ頭風神方ニテソロ〳〵療治スルモヨシモト頭風神方ト云モノハ先醒斎カ筆記ニハ脳漏ヲ療スルノ薬ナレドモ余リカ黴瘡ニ用テ効ヲ得ルトアリ其上湿症ニテナクナツドモ常ノ頭痛ナドニテ用テ頭ヲ清スルノ薬也

瘧

初寒気アツテ熱ニナル寸ハ疫ニ遠クルヿナシ間日瘧ハ初ニハ寒ケ有テワルイ出ル熱ニナリテカラハ咽乾汗出ツヨク朝ニナレハ熱気呆ヨクナルヿ足ハ極リ通リノ瘧之初ハ達原飲ヲ用ヘシ又温瘧ハフルイナク跡ハ前ノ通リ之是ハ九呆清脾飲強人ハ達原欠ニ常山石菖青皮ヲ加テ用ヘシ又白虎加圭支ヲ用ルモアリ腹ニ塊アル者ニハ常山用ベカラス瘧ト云モノハ凡テ胆

ノ府ニ預ルヿ故物ニ驚キ気ノシマルヿサヘア
レハヲチルモノ又瘧ノ渇スルニ水ヲ止ルヿ
アルヘカラズ大テイニ与フヘシ汗出解スルヿ
アル又油膩ノ物ナド与フベカラス胃府渟滞
スルヿヲキロフ停滞スレハ霍乱ヲナシ吐瀉
ナトスル又吐瀉ナド多スル寸ハ夫レニテ瘧暫
クハ治スルモノナレ𪜈気カ衰メ本ノ如クナル
𪜈ハ又寒ケ出震フモノヽ催シナカラ霍乱モ甚
クテ脉絶ニモ及呉茱萸湯ナトヲ用ベキ位ノ

症ニナルモノハ夫レ切ニテ大方治スルモノ也
扱常山ヲ用テヨトス圧食事ノ跡間ナシニ用或
ハ用テ間ナシニ食餌スル時ハ吐食スレハ常山
効少シ故ニ食胃中ニ治リ半時或一時程立テ用
ユベシ用法外臺千金ニテ考ヘシ又一二味ノ菜ニ
常山ノ効ヲ加ルハヨシ多味ノ菜ニ加ル寸ハ効
少シ扱又常山ヲ用ルハ丸ノ如シ常山大五 糯米大
ニ竹葉廿枚 右三味ヲ茶碗ニ水一合半入テ露下
ニサラスベシ椽端ノ雨ノ不入外ノ雲ノウツル

所ニ置其上ニサビサル刄物ヲ置サラシテ夜七ツ時起キ右茶碗ノ内ニ虫ナトイヌカ気ヲ付見ルベシ若シ虫ナド居ハ捨ツベシ翌夜右ノ菜ヲ一人ニ煎シ夜七ツ時ニ食餌ヲシ朝六ツ時ニ三ツ剋一ツ分用ヘシ又食餌ヲ五ツ半ヨリ四ツ時迄ニメ正昼ニ一ツ分又發スル時ニ臨テ用ユヘシ暫ク有テ悪心疼ヲ吐タ其内ニ苦キ水ヲ一トロカ二タロ吐トキハ落ルヿ用ル日ハ發スルモノナレドモヲチレハ翌日ハ発セザルヿ歩シハカゲ

ノサスト云テフルウフアレ圧寒ケモジハ〳〵ト
少レクシ熱モ少シ斗ニテ怒ムヿ其次ノ発リ目
前日ヨリ少クナルハ次第ニ落ルヿ又次第ニ強
ク成リ二三発モスレハ本ノ通リニ震フヿ是ハ
常山ノノ足サル故ヿ胃府壮ニテ食事ホノ害ナ
キ人ハカマイナク又一服モ用ベシ体サヘ丈夫ニ
メ食餌モヘラザル人ハ常山ヲ三度四度程用レ
ハコトヽクキル、ヿ不食ノ人ニ多ク用ル寸ハ
血ヲ吐ク者ヿ血ヲ吐時ハ胃引気薄クナリ浮腫

ヲ催メ虚腫トナリテ難治トナル也右ノ卅ニハ
実脾飲カ或ハ八味丸料ニテモ用ヘシ瘧後久ク
不食ノ平生多肉ノ人腫強キハ杏砂毒豆湯ヲ用
ベシ甚強ク不食メドウモナラヌニ控涎丹十四
五粒程ヅヽ用テ治スルヿモアリ又第二方専用
ユ奔ノ試驗方ニアリ百一選方至テ呑ミニクシ阿魏辰砂ヨク
キクヽ瘧ノ灸ノヿ大推ヘ明六ツ時ニ小豆粒程
ニメ三壮正昼ニ三火留飲甚モノニハ排蒼散ニ
匁ホト酒ニテ用ベシ甚下利スル也排蒼中間ノ

時トリ陰干ニスベシ紙袋ニ入レテツリテスヽ
扱瘧イエテ後養生第一ヽ喩ヘバ十フルイスレハ
向日モニハサ日ヽ大テイフルイ日限程立マテ
ハ堅ク慎ムヘシ胃府停滞スルヿヲ嫌フ之酒
事モ用〔同〕シヿヽ其後次第〳〵ニユルメテヨシ又
瘧落テ気力ヲエザル時ハ六君子湯ニ官分ヲ加
呆スヘシ不食スル者ハ香砂六君子湯モヨロシ
黄芪ナド入タル薬余斗モル時ハ寒ケ強ク成
テ不宜病後ノ養生ハ大ニイ疫症杯ノ通ニ

ニスレハヨシ

霍乱

楓亭先生曰霍乱ト云モノハ揮霍繚乱ノ字ヨリ出世医中暑ナドヽ云ハ非之俗ニイエバ食タイナドヽ云方ハマダヨシ霍乱ト云モノハ病家ニケンヲ取ラルヽモノ之心得行タル所カ如何ト問脈ヲ早ク見ヨト云其ヨウナ時ハ凡テ停食ニヨル物之初ニ冷物ナド食メ多発スルモノ之病家ニ習テ急ニスベカラス望問聞切ノ方ヲ慎ムベシ吐瀉ナキ内腹痛強ク手足冷脉杯モ上ルヽ如キアル

丆或冷物ナド前日カ又ハ其日食シ脉伏シ不出時ハ四逆湯或ハ附子理中湯之大体ニ脉モアリヒヤ〱ト冷止ハ附子無メ可之尤脉ノ有ルナキヲ目的トス甘中抔用心スベシ中合ニ一ハイ可ナランカ腹痛ツヨクドウモナラヌ時ハ吐泻ナク汗ナトモナク実ニアルモノ備急円ヲ用ユヘシ是モ中合ニ半分程用ユヘシ尤臨時可斟酌病家ヘ言聞スニハ此症霍乱ト云モノニメ何分吐カ泻カツカ子ハナラヌ丆吐泻アツテ後寒出フル

イクルモノ乄発熱スルモノハ陽気胺スル乄大
柴胡湯ヲ去将ヲ用ユヘシ乾霍乱ヲ後世攪腸痧
ト云吐瀉ノ跡フルイクルト胺ハ大ニ熱スル乄
其𪜈ハヲトロクヿハナキ乄是陽気外へ発セント
スル乄菜サヘ安ラカニヨシ受ル𪜈ハ熱ヲ目的
大柴胡湯ヲ用ヘシ咽乾キ熱モ大体アラハ五苓
散吐強ク胃乾燥スル故渇スル乄吐瀉甚シキニ
因テ胃中咽カ付茶水𪜈ニ更テ一滴モ胃中ニ治
ラサルハ呉茱萸湯ノ條下ヲ見ル𪜈ハ脉モ絶

如ク手足ノ厥冷ノヿヲイエ氏其症ノ処ヘ用ル
ハ呉茱萸湯ヲ持前右ノ如ク胃中ニ大吐下ノ跡
胃中ニ逆気アリ菜水氏ニ一滴モ不治者ニ呉茱
萸湯ヲ煎急ニ不用口中エ蜆貝ニ一ツ二ツ程ツヾ
ヽ入テ一昼夜程立テカラウスキ粥ヲ食セ夫ニ
再炊飯ナドヲ交エ用ヘシサスレハ胃ノ氣平復
メ五六日ノ内ニ平復スルヽ病家ニハ吐泻ノ強
キ物故ニ服ニ何モナキ故ニワカレノ出ルヿヲ
恐レテ吐泻後追々煎湯或ハ雑煮ホドヲ用大

吐下ヲヘタル上右ヨウノモノヲ用ル時ハ胃中停滞ヲ吐瀉治リカヌル之肩ナドツマリ或ハ青筋ナド出テクル事アリコレ痧病ノ用心ヲメ見ルベシ萬病回春ノ中青筋ノ証ト云リ其脉浮洪ニ易治者也脉微遲ナル者加ニ以気少不語昏沉者此為難治之卒中風ノ初発ヲ医者霍乱或食厥ナドヽ云卒中凡ハ氣逆ニヨツテ吐食スルモノ故腹痛ナドハ少キモノ之腹痛ニヨツテ其跡吐食アル者多クハ霍乱也中凡ハ腹痛ナキ

モノ〆只何トナク吐食煩燥スルモノハ是中爪
ナリ吐後半身不遂スル〆吐ヲハキヽルマデ
ハ手足ヨク動クモノ〆豚ナドモ洪大トナリ
菜ハ摂生飲丸吐ハ少シ吐アルモノハ蒡一竹
瀝湯ヘ

脾労　謙齋口授

脾労ト云ハ脾労実ト云ヿニテ脾労ト云ヿハ千金方ナトニモ名アリ準縄ニハ食労疳労トアリ大温中丸小温中丸ト云モノヲ用ユ其中ニハ鉄砂ヲ用テ胃中ノ熱ヲ去ルヿ甚妙ニ然レ𪜈脾気ノ弱キ人ハ胃中ノ運化カイナキ故ニ下リ易キモノニ左様ナル症ニ大剤ノ鉄粉ヲ用ル𪜈キハ大ニ服痛シテ下リ痞付テ止リニクキモノアリ是者脾気カイナキ故胃中ニヘアシキニ因

テ如此ニナルモノ〻左様ナル症ナルニハ鉄砂ヲ不用白丸ナトヲ用ルモヨシ皆丸ト云モノハ唐ノ方書有ヿニアラス和ノ奇方ニテ坂ノ下ト云モノ〻是方中ニモ鉄砂用ユレモ甚少シウドシノ粉ヲ大剤ニシテ用ユ是ハ畢竟ハ鉄粉丸ヲ軽クシテ用ユル〻

Feutei Fukui Sensei Kuju
[between 1750 – 1850]

National Library of Medicine
Bethesda, MD

CONDITION ON RECEIPT:
A title in manuscript ink and two stamps appeared on the front cover. The binding was dirty, worn torn, and creased. The back cover had major loss at the tail. The front was heavily stained at the head. The text block consisted of folios of Japanese paper folded at the fore edge with manuscript text. The volume was stab sewn with two pieces of rolled paper. The bottom sewing was broken, and the text block was poorly consolidated as a result. Most of the pages were slightly discolored. Some were insect damaged. A few were stained. The volume was housed in a cloth-covered wrapper with a textile tie.

TREATMENT REPORT:
The volume was microfilmed. Treatment was documented with color slides. The volume was collated and disbound. The head, tail and pages were surface cleaned with a soft brush. Tears were mended with Japanese kozo paper (Usumino, Hiromi Paper International) and wheat starch paste (Schweitzer's, Talas). The covers were repaired with Japanese kozo paper (Uda lightweight, Hiromi Paper International). The volume was sewn with twisted Japanese kozo paper (Hosokawa Ohban, Hiromi Paper International). The volume was returned in the cloth-covered wrapper along with the original paper "sewing" in a sleeve of Melinex (GE Polymer Shapes).

Northeast Document Conservation Center
24 October 2005
DW/KI